

Khoa Sản

Theo thống kê của tổ chức Y tế thế giới (WHO), hơn 500 ngàn phụ nữ chết hàng năm liên quan đến thai nghén và sanh đẻ, 99% trường hợp xảy ra ở các nước đang phát triển, trong số đó có 150.000 ca chết vì băng huyết sau sanh (BHSS) chiếm 25% tổng vong mạng. BHSS có thể xảy ra ngay sau sanh hay trễ hơn, có thể chảy máu ít, hay chảy máu kéo dài. Theo TS Vũ Thị Nhung (TP.HCM): "Trong số khoảng 30.000 sản phụ sinh tại Bệnh viện Hùng Vương mỗi năm, băng huyết sau sanh chiếm từ 1,5%-2%, trong đó có 35% phải truy cập máu". Theo thống kê Bệnh viện Tôn Đức (TP.HCM): "Băng huyết sau sanh là một trong năm tai biến sản khoa thường gặp, chiếm từ 2%-10% tổng số ca. Khảo sát trong nhiều năm liên tiếp tại Bệnh viện Tôn Đức, mỗi năm có ít nhất 100 trường hợp sản phụ bị băng huyết sau sinh trong tình trạng nặng".

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, BHSS chiếm tỉ lệ cao nhất trong 5 tai biến sản khoa, trong đó BHSS nặng và đe dọa tính mạng và sức khỏe sản phụ. Chính vì vậy, chúng tôi nghiên cứu đề tài "Tình hình BHSS phải truy cập máu năm 2012 tại Bệnh viện Quảng Nam" với 2 mục tiêu:

1. Nghiên cứu để tìm kiếm lâm sàng của các ca BHSS nặng cần truy cập máu.
2. Nghiên cứu các nguyên nhân gây BHSS và nhận xét các phương pháp xử trí BHSS cần truy cập máu.

Viết bởi Biên tập viên

Thủ bút, 21 Tháng 12 2013 20:33 - Lần cập nhật cuối Thủ bút, 21 Tháng 12 2013 21:07



[Xem tiếp toàn văn tại đây](#)