

Cách pha dung dịch morphine liều nh

Viết bởi Biên tập viên

Chỉnh sửa, 29 Tháng 11 2015 20:04 - Lần cập nhật cuối Chỉnh sửa, 29 Tháng 11 2015 20:31

ĐD Đ Th Trúc Linh - Khoa Ung B u

I/ Mục đích:

- Khi bắt đầu dùng morphine ta nên khởi đầu với liều thấp và dò liều tiếp cho bệnh nhân.
- Chính vì vậy ta nên pha dung dịch morphin liều nh để có thể dùng dịch morphine liều thấp hơn dùng bào chế sẵn có để dễ theo dõi và thu nhận lại cho Điều dưỡng và bệnh nhân- gia đình.
- Điều dưỡng dùng: dùng theo điều dưỡng uống, điều dưỡng tiêm thì tiêm dưới da, tiêm tĩnh mạch (không dùng điều dưỡng tiêm bắp)

II/ Các dạng morphine hiện có:

- Viên nang morphine 30mg (Morphine sulfate)
- Dung dịch tiêm morphine 10mg (Morphine chlohydrate)

Chỉnh sửa, 29 Tháng 11 2015 20:04 - Lần cập nhật cuối Chỉnh sửa, 29 Tháng 11 2015 20:31



II/ **Chức vụ và họ tên người ký**, có dán nhãn (bên dưới)

2. **Quảng Bình** **Morhina** **Update** 30mg, 06, 15, 30, 30ml

Đặc biệt, trong quá trình nghiên cứu và thực hiện dự án, nhóm đã nhận được sự hỗ trợ và khuyến khích từ các thầy cô và bạn bè. Điều này đã giúp nhóm vượt qua những khó khăn và hoàn thành dự án một cách tốt nhất.