

Bs. Võ Thị Kim Chung -

Nhóm 1: Không chẩn đoán/không đủ tiêu chuẩn

- Ít hơn 6 nhóm tế bào biểu mô nang giáp được báo cáo, nhu mô tế bào với mỗi nhóm có ít nhất 10 tế bào.
- Tế bào biểu mô nang giáp chưa rõ ràng, qui trình chuẩn bị hay nhu mô không đủ
- Dịch nang, có hay không có mô bào, và ít hơn 6 đám với ít nhất 10 tế bào.
- Làm tiêu FNA, trừ khi là 1 nang đơn thuần
- Có thể lập lại ngay đối với các nốt đặc

Nhóm 2: Lành tính

Benign follicular nodule

1. Mô tế bào ít đến trung bình trên nền keo giáp rõ ràng.
2. Các tế bào túi tuyến có bào tương mờ nhạt, nhân tế bào tròn hoặc bầu dục, kích thước nhân tương đương với hồng cầu, chất nhầy mô đặc biệt, đáng chú ý; phân bố sắp xếp thành các mảng mô tế bào, dạng tổ ong. Thường thấy các tế bào này có thể sắp xếp thành khối cầu 3 chiều với kích thước rất thay đổi.
3. Đối tượng bào quản hesimoderin rất thông thường.
4. Thường thấy có thể gặp các hình ảnh sau: mô tế bào ít nhân tế bào túi tuyến “overlapped & crowding”, teo li và thoái hóa trên nền rất nhiều keo giáp, tế bào Hürthle.
5. Thay đổi các tế bào lót nang (đặc biệt trong tế bào nang dạng nang) có thể gặp như: nhân lớn, chất nhầy mô đặc biệt, đáng chú ý hoặc dạng tế bào hình thoi.
6. Hiếm khi gặp hình ảnh nang nhỏ (microfollicles)

[Xem tiếp tại đây](#)