


Bs Huỳnh Thị Hoành -

Tổng quan

Số tiền huyết khối cấp tính có thể là biểu hiện đầu tiên của 20-30% các trường hợp ung thư. Bệnh lý ác tính tác động đến cách phân phối hệ thống cơ thể máu, thúc đẩy quá trình đông máu liên quan máu. Con đường chính tham gia vào phân phối này là sự kích hoạt của các nhân tố đông máu liên quan đến khối u, cuối cùng dẫn đến hình thành cục máu đông. Biểu hiện lâm sàng của huyết khối liên quan đến ung thư chủ yếu là tĩnh mạch và biểu hiện một loạt các tình trạng, bao gồm nhồi máu trí não, huyết khối tĩnh mạch của huyết khối tĩnh mạch. Việc cân bằng giữa lợi ích và nguy cơ trong quản lý thuốc chống đông ở bệnh nhân rất phức tạp, tùy thuộc vào mức tiêu và mong muốn của từng bệnh nhân, tiền sử khác nhau của từng loại ung thư, bệnh động mạch, tình trạng suy mòn cũng như nguy cơ chảy máu và biến chứng. Điều trị chống đông trong ung thư còn nhiều tranh cãi, cân nhắc việc dùng liều thấp để giảm nguy cơ chảy máu và phòng huyết khối vì đã chứng minh tính hiệu quả và an toàn so với điều trị thông thường. Bài này nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về sinh lý bệnh và quản lý huyết khối liên quan đến ung thư cũng như tóm tắt một số điểm nổi bật của những thử nghiệm lâm sàng gần đây.



[Xem tiếp tại đây](#)