

Furosemid bnh nhân suy tim v i phù kháng tr

Vi t b i Biên t p viên
Ch nh t, 27 Tháng 8 2023 08:21 -

BS.Nguy n T n H nh -

Furosemid là nhóm thuốc lợi tiểu đã được sử dụng từ nhiều thập kỷ và đã được FDA chấp thuận để điều trị các tình trạng liên quan đến quá tải dịch và phù do suy tim sung huyết, suy gan, suy thận. Tuy nhiên sử dụng trên lâm sàng đa số thường khá đơn giản nhưng vẫn tồn tại một số câu hỏi làm sao để tối ưu hóa việc sử dụng lợi tiểu, đặc biệt trong những trường hợp suy tim sung huyết với tình trạng quá tải dịch kém đáp ứng với điều trị. Mục tiêu bài viết này sẽ tập trung vào một số đặc điểm và các chỉ tác dụng, đặc điểm dùng thuốc, các chỉ định kháng với furosemid cũng như cách để vượt qua những tình huống khó khăn khi sử dụng lợi tiểu trên lâm sàng, đặc biệt là những bệnh nhân suy tim.

Level	Current Daily Furosemide* Dose	Bolus	Infusion Rate	Metolazone ^S (oral)
1	≤80 mg	40 mg	5 mg/hour	0
2	81–160 mg	80 mg	10 mg/hour	5 mg daily
3	161–240 mg	80 mg	20 mg/hour	5 mg twice daily
4	≥240 mg	80 mg	30 mg/hour	5 mg twice daily

Furosemid □ b□ nh nh□n suy tim v□ i phù kh□ng tr□

Vi□ t b□ i Bi□n t□ p vi□n

Ch□ nh□ t, 27 Th□ng 8 2023 08:21 -

[Xem ti□ p t□ i □y](#)