

Khoa Ngoại Chẩn Trị - Bs CK2 Phạm Ngọc Nhân

2. Các biện pháp chống chảy máu

2.1. Các biện pháp liên quan đến phẫu thuật

2.1.1. Mổ mổ.

Thuyên tắc tĩnh mạch sâu

Thuyên tắc tĩnh mạch sâu sau mổ chiếm tỷ lệ 7,5% sau các phẫu thuật bệnh trên các cơ quan lân cận mạch máu lớn. Đây là biện pháp phòng ngừa, có thể gây tử vong do hậu quả của thuyên tắc phổi. Để phòng tại bệnh này bằng cách vận động sớm và sử dụng kháng đông sau mổ. Phẫu tích nhồi nhét các cơ u trúc mạch máu là yếu tố quan trọng để tránh thuyên tắc mạch máu sau mổ. Sử dụng các retractor cầm tay, vén nhồi nhét các cơ u trúc mạch máu và có dành thời gian ngừng kéo các mạch máu trong quá trình phẫu thuật khi không làm các bước kỹ thuật ở vùng cần kẹp mạch máu góp phần ngăn ngừa tại bệnh này.

Viết bởi Biên tập viên

Thứ sáu, 15 Tháng 4 2016 08:31 - Lần cập nhật cuối: Thứ bảy, 23 Tháng 4 2016 09:55

