

Bs Trần Minh Quang -

I. Giới Thiệu

1. Mục Đích

Đánh giá này nhằm mục đích mô tả các công cụ đánh giá và tác động lâm sàng có khả năng xác định mê sảng ở bệnh nhân ngừng tim sau ngừng tim cũng như cung cấp các chỉ dẫn lâm sàng nhằm ngăn ngừa và điều trị mê sảng.

2. Những phát hiện gần đây:

Các yếu tố của bệnh nhân dẫn đến ngừng tim, nỗ lực hồi sức ban đầu và quản lý sau hồi sức đều ảnh hưởng đến khả năng phục hồi cũng như nguy cơ phát triển mê sảng. Dữ liệu cho thấy mê sảng ở bệnh nhân ngừng tim sau ngừng tim là một yếu tố nguy cơ độc lập đối với bệnh tật và tử vong. Nhận biết mê sảng ở bệnh nhân sau ngừng tim có thể là một thách thức, tuy nhiên, việc phát hiện không chỉ có thể được thực hiện mà còn quan trọng vì nó có thể giúp dự đoán các kết quả bệnh tật. Kiểm tra thần kinh liên tiếp và đánh giá mê sảng, nhằm mục tiêu an thần như khi có thể, hạn chế thu hẹp thần kinh và bắt đầu các gói chăm sóc bệnh nhân là những khía cạnh chăm sóc quan trọng không chỉ cho phép xác định sớm chấn thương não nguyên phát và thứ phát mà còn cải thiện thời gian hồi sức bệnh và tử vong của bệnh nhân.

Mê sảng sau phẫu thuật

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 28 Tháng 2 2023 20:34 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 28 Tháng 2 2023 20:52

