


Bs Lê Thị Bảo Ngọc -

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Với tầm nhìn “chăm sóc bệnh nhân viêm gan virus”, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra mục tiêu dự tham vọng là giảm 65% tỷ lệ tử vong liên quan đến viêm gan vào năm 2030. Với sự ra đời và phát triển các loại thuốc kháng virus như hiện nay, đặc biệt là nhóm thuốc kháng virus trực tiếp (DAAs), việc điều trị bệnh lý viêm gan virrus có nhiều tiến bộ vượt bậc. Tuy nhiên, ung thư biểu mô tế bào gan (HCC) vẫn còn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở bệnh nhân viêm gan mạn tính và là nguyên nhân gây tử vong liên quan đến ung thư thường gặp thứ tư trên toàn cầu. Do đó, chìa khóa để đạt được mục tiêu toàn cầu do WHO đề xuất là giảm tỷ lệ tử vong do HCC liên quan đến viêm gan virus.

Sự thành công của điều trị HCC phụ thuộc nhiều vào giai đoạn được chẩn đoán. Bệnh nhân mắc HCC được chẩn đoán ở giai đoạn sớm có tỷ lệ sống sót sau 5 năm là 70–75%, trong khi thời gian sống sót trung bình của bệnh nhân mắc HCC tiến triển là dưới 1 năm. Một chương trình giám sát HCC hiệu quả và thành công có thể đưa ra chẩn đoán sớm và cải thiện tiên lượng. Vì vậy, có một công cụ giám sát để xác định các bệnh nhân có nguy cơ mắc HCC khác nhau và sau đó cá nhân hóa việc giám sát HCC là điều rất quan trọng và cần thiết.

Viết bởi Biên tập viên
Thứ năm, 28 Tháng 9 2023 14:31 -



[Xem tiếp tại đây](#)