

(Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /QĐ-BYT ngày 12/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

ĐIỀU NG

Rắn nọc xanh đuôi đỏ thuộc họ Rắn nọc (Viperidae) giống Cryptelytrops. Họ Rắn nọc có nhiều giống và loài khác nhau nhưng có chung đặc tính là gây rối loạn đông máu, chảy máu.

Rắn Cryptelytrops albolabris (Tên cũ: Trimesurus albolabris) có tên Việt Nam là Rắn nọc xanh đuôi đỏ, phân bố trên cỏ ruộng, rắn thường sống trên cây.

Bệnh nhân bị rắn nọc C. albolabris cắn là một cấp cứu phải được theo dõi sát tại khoa Cấp cứu hoặc khoa Hồi sức cấp cứu đặc. Bệnh nhân bị C. albolabris cắn có rối loạn đông máu phải được điều u trị nếu có có khả năng truy n máu (và các chế phẩm máu) và có huyết thanh kháng nọc rắn nọc.

Cơ chế sinh bệnh: rối loạn đông máu do nọc rắn nọc xanh đuôi đỏ là do tiêu thụ hoặc ức chế các yếu tố đông máu, ngược lại bệnh rối vào tình trạng như đông máu nếu mạch rối rác (DIC), mất mất tạo ra các fibrin hoà tan, làm xuất hiện các cục huyết khối như rối rác trong lòng mạch, dẫn đến quá trình tiêu fibrin dẫn đến tiêu thụ quá nhiều các yếu tố đông máu và hậu quả là xuất huyết và thiếu máu tổ chức gây thiếu ôxy tổ chức. Chảy máu trong các khối cơ thể có thể gây hời chẹn ngang.



Hồ sơ ng d n ch n đoán và đi u tr r n l c xanh đuôi đ c n

Vi t b i Biên t p viên

Th ba, 13 Tháng 1 2015 14:39 - L n c p nh t cu i Ch nh t, 15 Tháng 2 2015 21:11

[Xem toàn văn t i đây](#)