





Source: Adapted from the 2015 Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada (SOGC) Clinical Practice Guideline for the Management of Women with a Pregnancy of Unknown Location (PUL).

Predictors	Enter Values
Initial serum hCG (IU/L)	1530
48 hour serum hCG (IU/L)	1250
Did the patient receive progesterone treatment?	no
Initial serum progesterone (nmol/L) <i>optional</i>	3.5

Hình 2: Nhập các giá trị vào bảng để tính toán chẩn đoán nguy cơ theo M6

PREDICTED PROBABILITIES AND CLASSIFICATION

Risk predictions		Interpretation
Risk of ectopic pregnancy	22.3 %	Patient in high risk group for ectopic pregnancy
Risk of failed PUL	69.5 %	
Risk of intrauterine pregnancy	8.2 %	




ẢNH CHỤP ẢNH SỰ KIỆN TRONG THỜI GIAN VÀ NƠI CHỖ (TIME AND LOCATION OF THE INCIDENT)

Cơ sở thực hành xử trí thai chửa a rồi vị trí

Vị trí biên tập viên

Thứ bảy, 03 Tháng 11 2018 11:52 - Lần cập nhật cuối: Chủ nhật, 04 Tháng 11 2018 16:37



Chẩn đoán và xử trí thai chửa a rồi vị trí không rõ ràng (PUL) và thực hiện protocol hai