

Đầu năm 2019, Trường học môn Tim mạch Hoa Kỳ/Hiệp hội Tim Hoa Kỳ/Hội Nhịp Tim Hoa Kỳ (ACC/AHA/HRS) đã công bố cập nhật hướng dẫn xử trí rung nhĩ. Đây là hướng dẫn cập nhật các điểm chính của hướng dẫn năm 2014, dựa trên các dữ liệu mới liên quan đến các thuốc chống đông đường uống tác động trực tiếp.

Một số điểm khác biệt chủ yếu giữa hướng dẫn 2014 và bản cập nhật năm 2019		
	Hướng dẫn 2014	Cập nhật 2019
NOACs sử dụng trong phòng ngừa đột quỵ	Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban (Class I)	Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban và Edoxaban (Class I)
Thuốc kháng đông đường uống cho BN phù hợp	Warfarin hoặc NOACs (Class I)	NOACs được khuyến cáo hơn warfarin (Class I)
Kháng đông đường uống được khuyến cáo cho BN suy thận giai đoạn cuối hoặc đang chạy thận chu kỳ	Warfarin (Class IIa)	Warfarin hoặc Apixaban (Class IIb)
Thuốc đối kháng với Dabigatran	N/A	Idarucizumab (Class I)

[Xem tiếp tại đây](#)