

Phù bạch mẫn sau đi u tr ung thu vú

Viết bởi Biên tập viên

Thứ năm, 16 Tháng 4 2020 17:39 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 16 Tháng 4 2020 15:45

Bs Lê Trung Nghĩa -

Phù bạch mẫn là sưng bạch thũng ở cánh tay, bàn tay, vú hoặc thân mình là tác động phản xạ phản thu hút ung thư vú và / hoặc xương. Phù bạch mẫn có thể xuất hiện ở một số người sau vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm sau khi kết thúc điều trị.

Bạch mẫn là một chất lỏng trong suốt, lưu thông khắp cơ thể để loại bỏ chất thải, vi khuẩn và các chất khác từ các mô. Phù là sự tích tụ của chất lỏng dư thừa. Vì vậy, phù bạch mẫn xảy ra khi quá nhiều bạch mẫn thu thập ở bất kỳ khu vực nào của cơ thể. Nếu phù bạch mẫn phát triển ở những người đã được điều trị ung thư vú, nó thường xảy ra ở cánh tay và bàn tay, nhưng đôi khi nó ảnh hưởng đến vú, nách, ngực, thân và / hoặc lưng.

Phù bạch mẫn thường phát triển dần dần, và bạn có thể cảm thấy một cảm giác bạch thũng - sưng húp như ngứa ran hoặc tê - đến và đi trước khi bắt đầu sưng có thể nhìn thấy xảy ra. Các triệu chứng phổ biến khác bao gồm đau nhức, cảm giác đầy hoặc nặng, bọng nước hoặc sưng, và giảm tính linh hoạt hoặc căng cứng ở tay, cánh tay, ngực, vú hoặc vùng nách. Điều trị sớm phù bạch mẫn rất quan trọng, vì vậy bạn nên nói với bác sĩ nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào trong số này.



[Xem tiếp tại đây](#)