

Bài Nguyên Ngữ c Tân -

1. Khái quát:

Hemangioblastoma là nhung khai u lành tính. Khai u trong sờ này thường xuất hiện sau (hemangioblastomas là nhung khai u nguyên phát phái biến trong ngoài trục hưng sau cột sống lợn). U thường thấy trên bán cầu tiêm não, thùy giun tiêm não hoặc thân não. Khoảng 100 ca hemangioblastoma trên lợn tiêm não đã được báo cáo. U cũng có thể xuất hiện sau tủy sống, chiếm khoảng 1,5% - 2,5% các khai u ở tủy sống. Mỗi liên hạch vĩnh màng não nguyên bào mề mào vẫn còn đang tranh cãi. Ngoài ra cũng khó phân biệt mô bạch hạch với ung thư bào bạch mô thính.

HGB có thể không thấy rõ, nhưng khoảng 20% xuất hiện trong bệnh nhân von Hippel-Lindau. HGB thường và hoặc xuất hiện trong 6% số bệnh nhân HGB tiêm não.

2. Đặc điểm:

HGB chiếm khoảng 1- 2,5% các khai u trong sờ. Chúng chiếm 7 – 12 % các loại u hưng sau. Khoảng 5 – 30% ca HGB tiêm não và 80% ca HGB tủy sống có liên quan đến bệnh von Hippel-Lindau.

Không nhiều trường hợp có xuất hiện sau tủy riêng biệt, trong khi các ca bệnh von Hippel-Lindau xuất hiện sớm (thường niên thứ 3 cột sống). Trong một số ca, HGB thường xuất hiện đón đón và có nguy cơ tái phát não (83%-95%), tủy sống (3%-13%), hành não (2%) hoặc bán cầu đính não (1,5%). Khoảng 30% ca bệnh HGB tiêm não có bệnh lý von Hippel-Lindau.

Hemangioblastoma (HGB): Nguyên bào mạch máu não

Viết bài Biên tập viên

Thứ hai, 13 Tháng 7 2020 20:33 - Lộn cộp nhặt cuội Thứ hai, 13 Tháng 7 2020 20:44

