

Bs Huỳnh Thị Hoanh -

TÓM TẮT

Những tiến bộ trong điều trị ung thư toàn thân đã giúp nhiều bệnh nhân kéo dài thời gian sống hơn. Điều này cũng làm cho những vấn đề về chất lượng cuộc sống và đặc tính liên quan đến điều trị được quan tâm hơn. Hội chứng bàn tay – bàn chân (Hand-foot syndrome – HFS) là một phản ứng da phổ biến trong liệu pháp toàn thân, thường gặp hóa trị liệu với pegylated liposomal doxorubicin, doxorubicin và fluoropyrimidines. Trong bài này, chúng tôi thảo luận dựa trên những hiểu biết hiện tại về chẩn đoán, triệu chứng, sinh lý bệnh và điều trị hội chứng bàn tay – bàn chân. Mặc dù hội chứng bàn tay – bàn chân không đe dọa tính mạng nhưng nó gây khó chịu và suy giảm chức năng, đặc biệt ở bệnh nhân tuối, những người nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống. Triệu chứng hội chứng bàn tay - bàn chân phụ thuộc vào loại thuốc hóa trị sử dụng, liều trình điều trị và thời gian điều trị trung bình. Các biện pháp hiệu quả để phòng và điều trị hội chứng bàn tay - bàn chân bao gồm điều trị tại chỗ và toàn thân, giảm liều và đổi thuốc khác trong cùng nhóm thuốc có thể gây hội chứng bàn tay - bàn chân thấp hơn. Những cách tiếp cận này giúp bệnh nhân duy trì điều trị, đồng thời giảm những tác động tiêu cực lên chất lượng cuộc sống. Biện pháp và phát hiện sớm để điều trị kịp thời, tránh giảm liều hay gián đoạn điều trị. Chúng tôi sẽ cung cấp những khuyến cáo hữu ích để những người quản lý hội chứng bàn tay - bàn chân trong thực hành lâm sàng.



[Xem tiếp tại đây](#)

Quản lý hồ i chng bàn tay- bàn chân do hóa tr li u đ c t bào

Viết bởi Biên tập viên

Th b y, 16 Tháng 4 2022 17:49 - L n c p nh t cu i Th b y, 16 Tháng 4 2022 17:53
