

Bs Lê Văn Thành -

Xu hướng điều trị K TLT trong tương lai.

Điều trị bổ sung cho bệnh nhân nguy cơ cao

+ Kết quả thử nghiệm STAMPEDE cho thấy lợi ích của việc bổ sung abiraterone vào ADT (liều pháp ức chế androgen) trong K TLT giai đoạn khu trú tại chỗ và hạch di căn tính có nguy cơ rất cao đã kích thích sự quan tâm đến việc điều trị tăng cường ở nhóm bệnh nhân này.

+ Nhiều thử nghiệm đánh giá các chế độ ức chế androgen theo hướng tiếp theo trong giai đoạn khu trú trên lâm sàng có nguy cơ cao đã tích lũy số liệu đầy đủ hơn hiện đang tích lũy. Ví dụ: ENZARAD đã hoàn thành tích lũy vào năm 2020, trong khi PROTEUS, một thử nghiệm ngẫu nhiên, mù đôi, có đối chứng với giả dược, giai đoạn 3 của apalutamide cùng với ADT so với giả dược cùng với ADT trình bày khi cắt bỏ tuyến gốc tuyến tiền liệt ở bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt tại chỗ hoặc tiến triển tại chỗ, đang thu thập tài liệu trung tâm trên toàn thế giới. Hơn nữa, DASL-HiCaP đang nghiên cứu tác động của darolutamide lên thời gian androgen miễn và khả năng sống sót không di căn ở bệnh nhân (tái phát / tiến triển dai dẳng tại chỗ và tái phát sinh học) có nguy cơ rất cao.

[Xem tiếp đây](#)