

Bs Nguyễn Thị Hà -

Tổng quan

Bệnh Paget là một bệnh ung thư biểu mô tuyến nội bì không phổ biến, đặc trưng bởi sự hiện diện của các tế bào Paget không điển hình, với tế bào chết rõ ràng, trong biểu bì. Nó được phân loại thành loại tuyến vú và loại ngoài tuyến vú.

Bệnh Paget phổ biến nhất ở vú, chiếm 1% –3% tổng số các trường hợp ung thư xâm lấn được chẩn đoán hàng năm.

Bệnh Paget ngoài tuyến vú thường liên quan đến các vùng da có nhu mô tuyến apocrine như vùng nách, âm hộ, đường阴道, bìu, vùng đáy chậu, hậu môn và vùng quanh hậu môn.


Căn bệnh này phổ biến nhất ở người da trắng, thường gặp ở bệnh nhân cao nhất từ 50-80 tuổi. Nghiên cứu gần đây đã quan tâm đến việc các tế bào Paget trong bệnh Paget ngoài tuyến vú (EMPD) là các tế bào tuyến có nguồn gốc apocrine đặc trưng bởi sự biểu hiện của kháng nguyên GCDPF, các cytokeratins trung gian phân biệt thấp và kháng nguyên carcinoembryonic. Thay đổi di truyền có thể đóng một vai trò trong cơ chế bệnh sinh của bệnh Paget nguyên phát, vì sự hoạt hóa của các con đường RAS / RAF và PI3K / AKT có liên quan đến cơ chế của bệnh Paget ngoài tuyến vú (EMPD)

Perianal Paget's disease (PPD) là một bệnh ung thư biểu mô tuyến trong biểu mô niêm mạc không rõ nguyên nhân, đặc trưng bởi mô hình biểu hiện của các tế bào Paget ác tính trong lớp biểu bì. PPD chiếm 20% tổng số bệnh Paget ngoài tuyến vú và 6,5% tổng số trường hợp bệnh Paget. Tiên lượng của PPD thường thấp là thường đi kèm với tuổi thọ trung bình và không bệnh là khoảng 60% sau 5 năm

Bệnh Paget quanh hõu môn

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 24 Tháng 5 2022 20:39 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 24 Tháng 5 2022 20:44



[Xem tiếp tại đây](#)