

Bs Lê Thị Ngọc Thành Vi -

TỔNG QUAN

Thiếu máu cấp cấp mạc treo tràng cấp tính (Acute mesenteric ischemia: AMI) là một hội chứng gây ra bởi lưu lượng máu qua các mạch mạc treo không đủ, dẫn đến thiếu máu cấp cấp và cuối cùng là hoại tử thành ruột. Mặc dù tiên lượng đối tử vong, nó là một bệnh lý có thể điều trị nếu được phát hiện sớm.


AMI có thể được phân loại là thiếu máu ruột nguyên phát hoặc thứ phát. AMI mà do bệnh động mạch có thể được chia nhỏ thành thiếu máu cấp cấp mạc treo không tắc (NOMI) và thiếu máu cấp cấp mạc treo do tắc (OMAI); OMAI có thể được chia nhỏ thành thuyên tắc động mạch mạc treo tràng cấp tính (AMAE) và huyết khối động mạch mạc treo tràng cấp tính (AMAT). AMI mà do bệnh tĩnh mạch có động huyết khối tĩnh mạch mạc treo (MVT). Trên lâm sàng AMI phân thành bốn nhóm như sau:

- Thiếu máu cấp cấp mạc treo không tắc – NOMI
- Thuyên tắc động mạch mạc treo tràng cấp tính – AMAE
- Huyết khối động mạch mạc treo tràng cấp tính – AMAT
- Huyết khối tĩnh mạch mạc treo – MVT

Thiếu máu cục bộ mạc treo tràng cấp tính

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 6, 25 Tháng 5 2022 19:19 - Lần cập nhật cuối: Thứ 6, 25 Tháng 5 2022 19:26



[Xem tiếp tại đây](#)