

Xét tra trong ung thư thực quản (p.2)

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 6, 17 Tháng 8 2022 19:57 - Lần cập nhật cuối Thứ 6, 17 Tháng 8 2022 20:12

Bs Lê Trung Nghĩa -

5. Mô phỏng 3D

- Thời gian: 15-20 phút

- Vị trí cánh tay/chân/đầu/cổ/vai: Đầu và cổ ở vị trí trung gian hoặc hơi nghiêng, tay chân duỗi thẳng, vai nên đỡ cổ càng thấp, càng tốt.

- Đặt ống cổ cứng: Đặt ống cổ cứng đầu vào cổ vai, Giữ cố định đầu

- Xác định tâm CTscan: Đặt vào CT, MRI trước mô phỏng.

- Chụp Ctscan mô phỏng ± cổ quang

- Kiểm tra Scout view

- Đặt dày lát cắt 3-5mm

- Giữ cố định trên: xương hàm dưới; Giữ cố định dưới: ngang rốn.

- Chụp hình, lưu vào phiếu xạ trị

- Ghi đầy đủ các thông số và ghi chú vào template.

- Xăm đầu



6. Các thành tích xạ trị:

(1) Xạ trị tri thức

Thành tích khối u (GTV): Bao gồm khối u nguyên phát (GTVp) và các hạch bạch huyết di căn (GTVn). GTVp là một tổn thương thực quản có thể nhìn thấy được có thể được xác định bằng cách sử dụng kết hợp các kỹ thuật hình ảnh (ví dụ: chụp thực quản, CT tăng cường quang, MRI và / hoặc PET / CT) và nội soi (ví dụ: nội soi đường tiêu hóa trên và / hoặc siêu âm nội soi). GTVn được định nghĩa là các hạch bạch huyết di căn có đường kính ≥ 10 mm (thực quản, rãnh khí quản ≥ 5 mm) được quan sát trên CT và / hoặc MRI. Ngay cả khi các hạch di căn của hạch bạch huyết theo các tiêu chuẩn này, những hạch có hình thể rõ ràng, tăng sinh hình tròn, tăng cường rõ rệt được coi là GTVn.

Xét tra trong ung thư thực quản (p.2)

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 6, 17 Tháng 8 2022 19:57 - Lần cập nhật cuối Thứ 6, 17 Tháng 8 2022 20:12

[Xem tiếp tại đây](#)