

Khoa Y học nhi khoa

I. Mục tiêu:

1. Trình bày được mục đích, tai biến, cách phòng và xử trí các tai biến khi chèn dò tủy sống
2. Theo dõi và chăm sóc người bệnh trong và sau khi chèn.
3. Nêu được những điểm cần chú ý trước và sau khi chèn.

II. Định nghĩa:

Tủy sống nằm trong ống sống ngang mức đốt C1 tới ngang đốt L2 xung quanh tủy sống có các màng não tủy bao bọc. Màng não tủy có 3 màng:

- Màng nuôi
- Màng nhện
- Màng cứng nằm ngoài cùng

Dịch não tủy trong suốt


Phụ giúp bác sĩ và theo dõi nồng độ bilirubin cho đến khi ổn định

Vị trí bệnh ở Bệnh viện

Thứ hai, 22 Tháng 10 2012 19:59 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 22 Tháng 10 2012 20:14

Áp lực tĩnh mạch 120 mmHg, tĩnh mạch 180 mmHg. Nếu áp lực tĩnh mạch trên 200 mmHg thì đó là tăng áp lực nội sọ.

Dịch não tủy có tác dụng nuôi dưỡng và bảo vệ tủy sống, do vậy dịch não tủy được sinh ra và lưu thông trong hệ thống kinh trung ương, cho nên trong nhiều trường hợp bệnh lý của hệ thống kinh trung ương làm thay đổi đến thành phần dịch não tủy. Do đó bác sĩ chẩn đoán dịch não tủy để chẩn đoán và điều trị.



Mục đích của chẩn đoán dịch não tủy:

Ph^o giúp bác s^o và theo dõi ng^o i b^o nh ch^o c dò t^o y s^o ng

Vi^o t b^o i Biên t^o p viên

Th^o hai, 22 Tháng 10 2012 19:59 - L^o n c^o p nh^o t cu^o i Th^o hai, 22 Tháng 10 2012 20:14

Ch^o c d^o ch não t^o y là ph^o ng pháp đâm kim vào khoang d^o i m^o ng nh^o n, ngang đ^o t s^o ng LIV-LV, nh^o m l^o y d^o ch não t^o y đ^o :

*** Ch^o n đoán:**

-D^o a vào

+ Quan sát màu s^o c d^o ch não t^o y.

+ Đo áp l^o c d^o ch não t^o y.

+ Xét nghi^o m :t^o bào, sinh hóa, vi khu^o n

-Áp d^o ng trong các tr^o ng h^o p sau:

+ Các tr^o ng h^o p nghi ng^o có viêm nhi^o m h^o th^o n kinh nh^o : Viêm màng não m^o , viêm não...

+ Các tr^o ng h^o p tai bi^o n m^o ch máu não: Xu^o t huy^o t não, màng não

+ Các tr^o ng h^o p nghi có chèn ép t^o y: u t^o y

*** Đ^o u tr^o :**

+ Tăng áp l^o c s^o não: l^o y b^o t d^o ch não t^o y

Phụ giúp bác sĩ và theo dõi người bệnh khi chích dò tủy sống

Vị trí bệnh nhân Biên tập viên

Thứ hai, 22 Tháng 10 2012 19:59 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 22 Tháng 10 2012 20:14

+ Đo áp lực dịch não tủy

+ Bơm thuốc vào ống sống

III Vị trí và tư thế người bệnh khi chích

Tư thế người bệnh khi chích dò: Người bệnh nằm nghiêng vòm mót bên, cong lưng và đầu gối sát vào ngực để làm hở các mấu gai.

Nơi chích thường là liên đốt L4 L5.

IV. Tai biến khi chích dò dịch não tủy:

Tụt huyết áp nhân tủy não do dịch chảy quá nhanh hoặc quá nhiều chèn ép hành não gây ngất ngất, ngất ngất

Viêm màng não mủ: không đơm bở vô khuẩn.

V Theo dõi và chăm sóc người bệnh trong và sau chích:

- Trong khi bác sĩ đâm kim vào thì đầu du dộng luôn theo dõi sức mót người bệnh.

- Ngay sau khi chích dứt người bệnh nằm sấp trong vòng 15 phút, sau đó cho nằm ngửa, đầu thả không kê gối trong vòng 1-2 giờ.

Phụ giúp bác sĩ và theo dõi người bệnh chờ chờ dò y sĩ ng

Viết bởi Biên tập viên

Thứ hai, 22 Tháng 10 2012 19:59 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 22 Tháng 10 2012 20:14

- Nếu người bệnh không được người dọ y kiểm tra tiếp tục, nếu thấy chóng mặt, đau đầu, người khó chịu phải báo ngay.

- Theo dõi toàn trạng trong 24 giờ : mạch, huyết áp, nhịp thở, theo dõi sát người bệnh để phát hiện kịp thời các biến chứng có thể xảy ra.