

Bs Võ Văn Phong -

Giới thiệu


Rung nhĩ là một rối loạn nhịp tim phổ biến trong thực hành lâm sàng, nhiều bệnh nhân trải qua phình thu hẹp ngoài tim sẽ có rung nhĩ trước, trong hoặc sau phẫu thuật. Trong một số trường hợp hiếm, chẩn đoán đã được thiết lập trước, trong khi phần lớn những người khác nó là mới.

Bệnh nhân rung nhĩ có tăng nguy cơ đột quỵ, suy tim và các biến chứng thuyên tắc huyết khối. Nguy cơ này có thể tăng lên trong thời gian phẫu thuật do các stress chu phẫu.

Đặc điểm lâm sàng

Tỷ lệ rung nhĩ ở Mỹ khoảng 3 triệu người, và nó tăng dần theo thời gian. Dự báo tỷ lệ rung nhĩ ở Mỹ vào năm 2050 nằm trong khoảng 5,6 đến 16 triệu người.

Rung nhĩ thường hay gặp ở những bệnh nhân cần thực hiện các phẫu thuật ngoài tim. Trong một nghiên cứu trên 38.047 bệnh nhân trải qua các phẫu thuật ngoài tim trong 7 năm, có 4.312 bệnh nhân (11%) có tiền sử rung nhĩ. Trong một nghiên cứu tương tự, bệnh nhân có tiền sử rung nhĩ có tỷ lệ đột quỵ trong 30 ngày sau phẫu thuật là 6,4 %, so với tỷ lệ 2,9 % ở những bệnh nhân có bệnh mạch vành. Điều này cho thấy mức độ thực tế là tỷ lệ đột quỵ chung cho phẫu thuật ở bệnh nhân rung nhĩ cao hơn gấp 2 lần so với những bệnh nhân có bệnh mạch vành.



Rung nhĩ b nh nhân ph u thu t ngoài tim

Vi t b i Biên t p viên

Th sáu, 30 Tháng 9 2022 14:16 -

[Xem ti p t i đây](#)