


Bs Huỳnh Minh Thảo –

I. Giới thiệu

Mục tiêu của liệu pháp truyền dịch chu phẫu là duy trì cân th trọng thái của máu và hydrat hóa mô tế bào, đảm bảo cân bằng nội môi để phân hủy đồ cung cấp sẵn cân bằng chính xác giữa cung và cầu oxy, tránh các tác động phụ bất lợi. Mặc dù việc sơ đồ ng dch truyền tĩnh mạch là một trong những can thiệp thường xuyên nhất trong giai đoạn chu phẫu của bất kỳ trường hợp phẫu thuật nào, việc lựa chọn giữa các loại chất lỏng khác nhau, liều lượng, cách quản lý và theo dõi vẫn còn nhiều tranh cãi. Dịch phải được truyền theo mục tiêu điều trị, và chúng phải được cung cấp đúng lúc và liều lượng, tôn trọng chế độ dinh dưỡng, xem xét tình trạng lâm sàng của bệnh nhân và loại phẫu thuật được thực hiện

Trong nghiên cứu FLUID DAY, nghiên cứu quan sát cắt ngang, đa trung tâm được thực hiện tại 131 bệnh viện Tây Ban Nha vào tháng 2 năm 2019, bao gồm những bệnh nhân trẻ thành được gây mê toàn thân cho phẫu thuật chẩn hoặc không chẩn (6314 bệnh nhân) cho thấy: Dịch truyền được sơ đồ ng rõ ràng rất nhất là dịch tinh thể cân bằng. Dịch keo được sơ đồ ng ít nhất ở ít bệnh nhân. Phẫu thuật kéo dài hàng giờ có xu hướng hơn cho bệnh nhân có nguy cơ cao hơn những mức độ biến thiên lượng dịch thay đổi cao quanh phẫu thuật.



HES: Hydroxyethyl starch

[Xem ti p t i đây](#)