



### BsCKI Nguyễn Xuân Hiền -

#### Khái quát chung:

- Sơ phân loại này bao gồm các khối u có nguồn gốc từ buồng trứng (nguyên phát)
- Liên đoàn y tế thế giới (WHO) phân loại ung thư biểu u mô tuyến thành dịch buồng trứng thành hai loại: grade cao và thấp, có đặc điểm khác nhau về phân tử và, hóa mô miễn dịch, hình thái, các đặc điểm sinh và số tiên tri của khối u.
- Ung thư biểu u mô thành dịch thấp xu hướng phát triển thành dịch lành tính hoặc giáp biên ác.
- Các loại ung thư biểu u mô buồng trứng đáng kể, đáng ngại nhất, tế bào chuyển tiếp của các đột biến P53 và thu được loại ung thư biểu u mô thành dịch độ cao.
- Nhiễm đột biến gen đột biến tìm thấy trong u mô đệm dịch, u tế bào hạt, u tế bào Sertoli-Leydig biệt hóa kém,...
- Liên quan đến hội chứng MEN (Multiple Endocrine Neoplasia) 2A, 2B ; Hội chứng ung thư biểu u mô tuyến giáp thể gia đình (FMTG); bệnh von Hippel-Lindau, hoặc bệnh u sợi thần kinh.
- Cũng có thể liên quan đến đột biến gan RET
- Thường được phát hiện qua xét nghiệm calcitonin máu hoặc phân tích đột biến gen RET



U nang dịch buồng trứng giáp biên ác



Ung thư biểu mô tuyến thành dịch độ cao

[Xem tiếp tại đây](#)