

Bs Lê Thị Hà –

Lao là một bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn lao (*Mycobacterium tuberculosis*) gây nên. Bệnh lao có thể gặp ở tất cả các bộ phận của cơ thể, trong đó lao phổi là thể lao phổ biến nhất (chiếm 80 - 85% tổng số ca bệnh) và là nguồn lây chính cho người xung quanh.

I. CHẨN ĐOÁN LAO NGOÀI PHỔI

Lao ngoài phổi là thể lao khó chẩn đoán - do vậy để tiếp cận chẩn đoán, người thầy thuốc trong quá trình thăm khám người bệnh phải hỏi bệnh sử và tìm kiếm các dấu hiệu của bệnh lao, phân biệt với các bệnh lý ngoài lao khác và chỉ định làm các kỹ thuật, xét nghiệm để đó chẩn đoán xác định dựa trên:

- Các triệu chứng, dấu hiệu có quan ngoài phổi nghi bệnh.

- Luôn tìm kiếm xem có lao phổi hay không, sàng lọc ngay bằng Xquang phổi. Nếu có lao phổi sẽ là cơ sở quan trọng cho chẩn đoán lao ngoài phổi.

- Lấy bệnh phẩm từ các vị trí tổn thương để xét nghiệm:

- Tìm vi khuẩn bằng kỹ thuật nhuộm soi trực tiếp, nuôi cấy, Xpert MTB/RIF (với bệnh phẩm đờm nhầy, đờm, dịch phổi, dịch màng, dịch (màng) các màng, mô tổn thương hạch, xương, tai, khớp, ...).

- Xét nghiệm mô bệnh, tế bào học xác định hình ảnh tổn thương lao.

- Chẩn đoán lao ngoài phổi dựa trên không kết hợp với lao phổi thường khó khăn, cần dựa vào triệu chứng nghi lao (sốt về chiều kéo dài, ra mồ hôi ban đêm, sút cân); triệu chứng tại chỗ nghi có quan bệnh tổn thương, nguy cơ mắc lao.

Lao màng não – não

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 09 Tháng 5 2023 09:44 -

- Mục đích chính xác của chẩn đoán phết thu thập nhiều vào khả năng phát hiện của các kỹ thuật hình ảnh: X-quang, siêu âm, sinh thiết, xét nghiệm vi khuẩn học.



[Xem tiếp tại đây](#)