

BS. Phan Tuấn Kiệt –

Phần 2: Các tổn thương khác

Các khối u mềm


Hình ảnh siêu âm tổn thương chóp mắt có thể khác nhau tùy thuộc vào tổ chức thành phần mô. Trong khi các tổn thương bao gồm mô nguyên chất có xu hướng giảm âm trên siêu âm, thì các tổn thương có hỗn hợp mô và các thành phần mô mềm khác cho thấy tăng phản âm. Do đó, MRI với các xung xóa mô tổn thương cần thiết để xác nhận sự hiện diện của mô trong tổn thương.

Mô mỡ (Lipoma) với thành phần mô thường thành phần biệt lập riêng, nhưng nó chỉ chiếm 4% trong tất cả các khối u mô mềm ở trẻ em. Trên siêu âm, lipoma có nhiều hình dạng khác nhau tùy thuộc vào tổ chức thành phần của mô và nằm trong tổn thương và vị trí khối u. Nó thường xuất hiện dưới dạng mô tăng âm nhợt nhạt với độ hồi âm thay đổi so với cơ trực lân cận.

Siêu âm các t_un th_ung mô m_ôm tr_uem (tt)

Vi_tt b_ii Biên t_pp viên

Th_u ba, 25 Tháng 7 2023 10:18 -



[Xem clip video](#) này để giải thích ý nghĩa của các kết quả siêu âm cho thấy khi i tăng âm