

Viết bởi Biên tập viên
Chỉnh sửa, 27 Tháng 8 2023 08:21 -

Furosemid là nhóm thuốc lợi tiểu đã được sử dụng trong nhiều thập kỷ và đã được FDA chấp thuận cho điều trị các tình trạng liên quan đến quá tải dịch và phù do suy tim sung huyết, suy gan, suy thận. Tuy nhiên, sử dụng trên lâm sàng đã chứng minh rằng khả năng giảm nguy cơ tử vong tổng thể và cải thiện làm sao để tối ưu hóa việc sử dụng lợi tiểu, đặc biệt trong những trường hợp suy tim sung huyết và tình trạng quá tải dịch kém đáp ứng với điều trị. Mục tiêu bài viết này sẽ tập trung vào một số đặc điểm và cơ chế tác động, đặc biệt là tác dụng lợi tiểu, cơ chế đối kháng với furosemid cũng như cách để vượt qua những tình huống khó khăn khi sử dụng lợi tiểu trên lâm sàng, đặc biệt là những bệnh nhân suy tim.

Level	Current Daily Furosemide* Dose	Bolus	Infusion Rate	Metolazone [§] (oral)
1	≤80 mg	40 mg	5 mg/hour	0
2	81–160 mg	80 mg	10 mg/hour	5 mg daily
3	161–240 mg	80 mg	20 mg/hour	5 mg twice daily
4	≥240 mg	80 mg	30 mg/hour	5 mg twice daily

Furosemid □ b□ nh nhân suy tim v□ i phù kháng tr□

Vi□ t b□ i Biên t□ p viên

Ch□ nh□ t, 27 Tháng 8 2023 08:21 -

[Xem ti□ p t□ i đây](#)