

Trung tâm CTCH – Bệnh và PHCN

Thay thế grafted toàn phần và thay thế háng toàn phần là hai trong số các phẫu thuật được thực hiện phổ biến nhất. Đối với phần lớn bệnh nhân, phẫu thuật thay thế khớp làm giảm đau và giúp họ có cuộc sống đầy đủ hơn, năng động hơn.

Tuy nhiên, không có quy trình phẫu thuật nào là không có rủi ro. Một số ít bệnh nhân được thay thế khớp háng hoặc khớp gối (khoảng 1/100 hoặc 1%) có thể bị nhiễm trùng sau phẫu thuật.

- Nhiễm trùng khớp thay thế có thể xảy ra ở vết mổ hoặc sâu xung quanh bề mặt phần cấy ghép nhân tạo (kim loại và nhựa).
- Nhiễm trùng có thể phát triển trong thời gian nằm viện hoặc sau khi về nhà.
- Nhiễm trùng khớp thay thế thậm chí có thể xảy ra nhiều năm sau khi phẫu thuật.

Bài viết này thảo luận về:

- Tại sao khớp thay thế có thể bị nhiễm trùng
- Các dấu hiệu và triệu chứng nhiễm trùng
- Điều trị nhiễm trùng
- Các cách giúp ngăn ngừa nhiễm trùng

Nhiệm vụ trung tâm khám nhân tạo

Viết bài Biên tập viên

Thứ bảy, 06 Tháng 4 2024 16:34 -



[Xem tiếp tại đây](#)