


Ths Tràn Thị Minh Thanh - Khoa Nhi THóa

I. Định nghĩa:

Web thớ c quăn bệnh hiếm gặp, là bất thường cấu trúc trong thớ c quăn, hiện nay vẫn còn có nhiều bàn cãi giữa các nhà y học về thuật ngữ, sinh bệnh học và điều trị bệnh lý này. Có tác giả dùng từ là vòng (ring) thớ c quăn, một số khác dùng màng (web) thớ c quăn. Bệnh lý này thường không có triệu chứng, tuy nhiên nếu vòng làm hẹp lòng thớ c quăn nhiều thì gây nuốt nghẹn

Màng thớ c quăn là vòng đóng tâm, mỏng, mỏng (3mm-5mm) là sợi mỏng rộng của mô thớ c quăn bình thường bao gồm 3 lớp (niêm mạc, dưới niêm mạc, lớp cơ). Màng thớ c quăn có thể tìm thấy bất cứ nơi nào trên thớ c quăn nhưng thường thấy ở đoạn dưới thớ c quăn. Có 3 màng thớ c quăn thì dễ dàng phân chia theo bệnh cảnh A, B, C.



Màng (vòng) A là vòng cổ út gặp, nó nằm trên chổ nối thớ c quăn dày (đường z) 1,5cm, hiếm

Bệnh web thọc quốn: chẩn đoán và điều trị

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 02 Tháng 6 2015 19:28 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 02 Tháng 6 2015 20:36

khi có triệu chứng.

Màng (vòng) B còn gọi là vòng Schatzki (mang tên bác sĩ người Mỹ gốc Đức Richard Schatzki) là vòng phình bên nhót nó gồm lớp niêm mạc và lớp dưới niêm mạc, nó nằm ngay chổ nối thực quản dạ dày (đường Z), phần lớn bệnh nhân không có triệu chứng.

Màng (vòng) C bất thường gọi là phình phát hiện trên Xquang, do nằm vào thực quản của cả hoành rốn khi có triệu chứng.

Nguyên nhân của Web thọc quốn đang còn bàn cãi, một số giả thuyết đã được đưa ra, một số nguyên nhân gây bệnh đã được đưa ra: bẩm sinh, thiếu sót, do viêm, teo mòn.

Bẩm sinh

Web thọc quốn là do sự phát triển của phôi thai không toàn vẹn thực quốn hoàn toàn, tuy nhiên hầu hết các bệnh nhân có các triệu chứng xuất hiện khi họ trên 40 tuổi, nếu chụp Xquang thực quốn có barryt trẻ em đã gợi ý web thọc quốn vòng B hay gấp, hầu hết trẻ em đều không có triệu chứng nên chụp Xquang thực quốn có barryte ít được chẩn đoán.

Thiếu sót

Mọi liên hệ giữa web thọc quốn và thiếu sót vẫn còn tranh cãi.

Viêm

Các tế bào viêm có thể được tìm thấy trong các mẫu sinh thiết của web thọc quốn, Các tế bào viêm phình bên trong các tổn thương thực quốn đo xa hơn các tổn thương thực quốn đo gần.

Tóm tắt

Các bệnh tổ mi liên quan đến bệnh web thọc quăn bao gồm: bệnh tuyến giáp, viêm khớp dạng thấp, hội chứng Stevens-Johnson, bệnh vẩy nến. Cần nghiên cứu để hỗ trợ cho mối liên quan web thọc quăn với các bệnh này.

II. Triệu chứng

Hầu hết các bệnh nhân không có triệu chứng. Tác giả Schatki báo cáo số thống quan giữa đường kính của vòng thọc quăn với triệu chứng của bệnh nhân. Đường kính vòng thọc quăn >20mm hầu như không có triệu chứng khó nuốt, 13-20mm có thể có khó nuốt, <13mm có triệu chứng khó nuốt.

Thống bệnh nhân phát hiện triệu chứng sau 40 tuổi, xuất hiện phổ biến ở người cao tuổi khả năng là do khả năng nhai và nuốt người cao tuổi bị hạn chế.

III. Chẩn đoán

Đưa vào chụp thọc quăn có barryte và nội soi thọc quăn. Nghi ngờ khi phát hiện Web thọc quăn tình cờ chụp Xquang thọc quăn có barryte và nội soi thọc quăn vì bệnh lý khác.

IV. Điều trị

Không có triệu chứng không cần điều trị.

Thiêu đốt có thể đóng góp vào sự phát triển của web thọc quăn nên xét nghiệm sốt trong máu,

Bệnh web thọc quăn: chẩn đoán và điều trị

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 02 Tháng 6 2015 19:28 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 02 Tháng 6 2015 20:36

Nếu đang thi u sốt bổ sung sốt.

Nếu có triệu chứng trào ngược axit dày thọc quăn và web thọc quăn điều trị sẽ được hướng vào việc điều trị trào ngược axit.

Nếu nuốt khó khăn tiếp tục, thọc hiên nội soi và nong thọc quăn.

Nếu không cải thiện triệu chứng khi điều trị nong thọc quăn nhiều lần. Trong trường hợp này dùng dùng đặt đặt đặt đặt đặt vòng niêm mạc.

V. Phòng bệnh




Không có cách nào để phòng bệnh web thọc quăn. Tuy nhiên, vì tình trạng này có thể liên quan đến trào ngược axit hay thi u máu thi u sốt, chúng ta có thể có biện pháp để ngăn ngừa và điều trị các rủi ro. Tránh các loại thực phẩm thúc đẩy trào ngược axit, đặc biệt là cà phê, sô cô la, các thức ăn béo, thực phẩm nhiều gia vị, đồ uống có ga, bia, rượu, hoa quả họ cam quýt, cà chua, socola nguyên chất và hành tây. Việc điều trị thi u máu do thi u sốt khác nhau tùy thuộc vào nguyên nhân của vấn đề.

Một số hình ảnh Xquang và nội soi:

Bệnh web thực quản: chẩn đoán và điều trị

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 02 Tháng 6 2015 19:28 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 02 Tháng 6 2015 20:36



Can. J. Gastroenterol. (2013) 27(12):1000-1004. Epub 2013 Oct 1. PMID: 24011552. (2013), ISOPHARMAGE Webs and Rings, A Disappearing Webs",