

Bs CKI Nguyễn Xuân Hiền - Khoa GPB

Bệnh Lymphoma Hodgkin (LH) được chia thành 02 nhóm chính, nhóm LH cổ điển ('classical' Hodgkin lymphomas) và nhóm LH ưu th lymphô bào dòng nốt (nodular lymphocyte-predominant Hodgkin lymphoma)

Lymphom Hodgkin ưu th lympho bào dòng nốt (NLPHL)

Lymphom Hodgkin cổ điển, phân thành 4 type:

- Lymphom Hodgkin loại giàu lympho bào Lymphocyte-rich Hodgkin lymphoma (LRCHL)
- Lymphom Hodgkin loại xơ nốt nodular sclerosis Hodgkin lymphoma (NSHL)
- Lymphom Hodgkin loại hỗn hợp tế bào mixed cellularity Hodgkin lymphoma (MCHL)
- Lymphom Hodgkin loại ít tế bào lympho lymphocyte-depleted Hodgkin lymphoma (LDHL)


1. Lymphom Hodgkin ưu th lympho bào dòng nốt (NLPHL)

- Tên gọi khác: Lymphom Hodgkin loại tế bào lympho và mô bào (L&H), u cổ n hạt dòng nốt (nodular paraganuloma).
- Chiếm 5% Lymphom Hodgkin
- Nam/ nữ = 2,5
- Tuổi: trẻ em đến trung niên
- Lâm sàng: thường 1 hạch lớn ở vùng cổ, bẹn, nách. 80% giai đoạn I và II, hiếm có triệu chứng B
- Tiên lượng: tốt hơn loại cổ điển.
- Ví dụ:


Đặc điểm lâm sàng và phân loại mô bệnh học của bệnh Lymphoma Hodgkin

Viết bởi Biên tập viên


Thứ năm, 29 Tháng 10 2015 13:58 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 29 Tháng 10 2015 14:18




CD30 (+)




CD15 (+)




CD20 (+)




CD45RB (+)



CD45 (-)




EMA (+)



CD57 (+)


2. Lymphoma Hodgkin loại tế bào lympho bào (LRCHL)

Hiện nay, bệnh lymphoma Hodgkin loại tế bào lympho bào (LRCHL) là một bệnh hiếm gặp, chỉ chiếm 1-2% tổng số bệnh lymphoma Hodgkin. Bệnh này có đặc điểm lâm sàng và mô bệnh học khác biệt so với các loại lymphoma Hodgkin khác.





LRCHL thường gặp dạng nốt, ít khi lan tỏa, các tế bào RS dạng hốc thường tìm thấy ở vùng quanh các nốt.


3. Lymphoma mô mềm (NHL) (NSHL) thường gặp ở II: 35% hình nhân đốm (chẩn đoán giai



NSHL được đặc trưng bởi các nốt tế bào u bao quanh bởi các dải mô liên kết sợi dày được nhìn thấy rõ ở độ phóng đại nhỏ.





NSHL: Tế bào RS điển hình thường thấy là loại RS dạng hốc





NSHL: có thể có kiểu đơn dạng hoặc đa dạng, các tế bào RS dạng hốc và các biến thể của nó. Có hoặc không có thành phần phản ứng.

- Hóa mô miễn dịch:



NSHL. A: Tế bào RS và các biến thể của nó dương tính với CD15. B: Tế bào RS âm tính với CD45 (LCA) và dương tính với tế bào lympho bao xung quanh



Xếp hóa lan tỏa mức độ vừa phải nhưng không tạo thành dải collagen

60.9.14.3. Hình ảnh mô bệnh học của bệnh Lymphoma (ĐSH) ở giai đoạn II (bên trái) và giai đoạn III (bên phải) của bệnh.

