

CN Nguyễn Minh Nhật - Khoa CĐHA

TÓM TẮT

Thủng ruột non là bệnh lý cấp cứu, để chẩn đoán không phải bằng lâm sàng mà bằng CT, đây là khảo sát hình ảnh thông thường để chẩn đoán bệnh lý bụng cấp. Đặc điểm CT trước tiên gợi ý thủng là khí và thu hẹp cột quang đường ruột ngoài lòng ruột, thường kèm theo các dấu hiệu phụ của bệnh lý ruột non. Bài này đưa ra các dấu hiệu CT của thủng ruột non do nhiều bệnh cột lâm sàng khác nhau.

MỞ ĐẦU

Thủng ruột non là tình huống cấp cứu có biểu hiện đau bụng cấp và hiếm khi chẩn đoán được trên lâm sàng. Ngày nay, CT thường là phương pháp đầu tiên để đánh giá bệnh nhân bụng cấp, bác sĩ X quang có thể là người đầu tiên gợi ý chẩn đoán. CT cung cấp chi tiết hơn phụ thuộc vào vị trí và chẩn đoán được hiệu quả bằng cách tìm kiếm thành ruột trực tiếp, phát hiện các dấu hiệu thủng phát của bệnh lý ruột trong mạc treo xung quanh và mô tế bào ruột khí ngoài lòng ruột hoặc thu hẹp cột quang đường ruột rò vào khoang phúc mạc. Mục đích của bài này là đưa ra các đặc điểm CT của thủng ruột non gây ra do nhiều bệnh nguyên khác nhau.


Các dấu hiệu CT trong thủng ruột non

Viết bởi Biên tập viên


Thứ năm, 17 Tháng 3 2016 19:34 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 17 Tháng 3 2016 19:47




(a)



(b)



(c)



(d)

[Xem toàn văn tại đây](#)