

Bs CKII Nguyễn Tam Thăng - Khoa Ngoại CT

Trong chứng thối ng bàn tay, vết thối ng h bàn tay gây đau và mất máu cho bệnh nhân vì vậy cần đi u trị c p c u. người đi u tiên c p c u có thể là bác sĩ gia đình, hoặc mất c s đi u trị c p c u ban đầu không phải là ph u thu t viên bàn tay. Bác sĩ lâm sàng cần hi u s quan trọng của việc đi u trị là nhanh chóng và phải dứt khoát với mọi vết thối ng. Nhưng chứng thối ng cần phải đi u trị ở đơn vị chuyên khoa. Tuy nhiên, bệnh vết thối ng nhẹ cũng rất quan trọng. Nếu u vết thối ng có thể tiến triển nặng hơn cần u trúc sâu đi kèm. Bởi vì bác sĩ lâm sàng cần phải có những kiến thức cơ bản về bàn tay để có thể có những đánh giá thích hợp



[Xem tiếp tại đây](#)

Trong chứng thối ng bàn tay, vết thối ng h bàn tay gây đau và mất máu cho bệnh nhân vì vậy cần đi u trị c p c u. người đi u tiên c p c u có thể là bác sĩ gia đình, hoặc mất c s đi u trị

Vật thể ng bàn tay

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 7, 06 Tháng 4 2016 16:08 - Lần cập nhật cuối Thứ 7, 06 Tháng 4 2016 16:15

Cơ sở của ban đầu không phải là phụ thu viên bàn tay. Bác sĩ lâm sàng cần hiểu sự quan trọng của việc đi u tr là nhanh chóng và phải dứt khoát với mọi vật thể ng. Nhưng t n th ng n ng cần phải đi u tr đ n v chuyên khoa. Tuy nhiên, nh ng v t th ng nh cũng r t quan trọng. nh u v t th ng có th t n th ng nh ng c u trúc s s u đi kèm. Đòi hỏi bác sĩ lâm sàng cần phải có nh ng kĩ n th c c b n v bàn tay đ có th có nh ng đánh giá thích h p