

Khoa Ngoại khoa Thượng - BS CK2 Phan Ngoc Linh

2. Các biến chứng sau mổ

2.1. Các biến chứng liên quan đến đường mổ

2.1.1. Mổ chích máu.

Thuyên tắc tĩnh mạch sâu

Thuyên tắc tĩnh mạch sâu sau mổ chiếm tỷ lệ 7,5% sau các phẫu thuật baring trên các cung quan lân cận mổ chích máu lỏng. Đây là biến chứng nặng, có thể gây tử vong do hụt quí cung thuyên tắc phổi. Để phòng tai biến này bằng cách vận động sớm và sớm dùng kháng đông sau mổ. Phẫu tích nhúng nhàng các cung trúc mổ chích máu là yếu tố quan trọng để tránh thuyên tắc tĩnh mạch sâu mổ. Sử dụng các retractor cầm tay, vén nhúng nhàng các cung trúc mổ chích máu và có dành thời gian ngắn kéo các mổ chích máu trong quá trình phẫu thuật khi không làm các bước kín mít thuỷ tinh vùng cung kín mổ chích máu góp phần ngăn ngừa tai biến này.

Các biến chứng của phổi thuỷ tinh sừng thường bùng phát trong menses (tt)

Vịt bòi Biên tảo viên

Thứ sáu, 15 Tháng 4 2016 08:31 - Lần cập nhật cuối cùng Thứ bảy, 23 Tháng 4 2016 09:55

