Vi□t b□i Biên t□p viên
Th□ b□y, 30 Tháng 7 2016 09:38 - L□n c□p nh□t cu□i Th□ b□y, 30 Tháng 7 2016 10:37

Ths Lê Văn Tu□n - Khoa ICU

Các nhà nghiên c□u B□ c□nh báo: H□n m□t ph□n ba s□ ph□ n□ mang thai b□ thi□u s□t, đ□t h□ vào nguy c□ gia tăng b□nh lý tuy□n giáp, s□ làm tăng kh□ năng x□y ra các bi□n ch□ng khi mang thai nh□ s□y thai.

Các nghiên c□u đ□□c công b□ tr□c tuy□n trong *T□p chí N□i ti□t Châu Âu* vào ngày 22 tháng 7 năm 2016, ch□ ra r□ng 35% c□a 2000 ph□ n□ có thi□u s□t trong 3 tháng đ□u mang thai, và đi□u này làm tăng nguy c□ h□n 50%.

Trong khi các nghiên c□u tr□□c đây ch□ ra r□ng thi□u s□t khi mang thai có th□ □nh h□□ng t□ 24% đ□n 44% s□ ph□ n□, thì đây là l□n đ□u tiên cho th□y các hi□u □ng ph□ c□a m□t t□ l□ tăng b□nh tuy□n giáp t□ mi□n.

Tác gi□ chính Kris G Poppe, MD, PhD, Tr□□ng Phòng khám n□i ti□t, B□nh vi□n Đ□i h□c CHU St-Pierre, Brussels, B□, nói v□i Medscape Medical News r□ng phát hi□n này r□t quan tr□ng vì b□nh tuy□n giáp t□ mi□n □ ph□ n□ mang thai làm tăng nguy c□ s□y thai, sinh non, và cân n□ng s□ sinh th□p h□n so v□i ph□ n□ không b□ □nh h□□ng.

Tình trạng thiếu sắt trong thai kỳ liên kết với bệnh tuyến giáp

Viết bởi Biên tập viên
Thứ bảy, 30 Tháng 7 2016 09:38 - Lần cập nhật cuối Thứ bảy, 30 Tháng 7 2016 10:37



[redacted] http://www.medscape.com/viewarticle/866767 [redacted]