

Bs Phạm Văn Thanh - Khoa GMPT

I. Lịch sử :

- Năm 1848 James Simpson là người đầu tiên báo cáo triệu chứng hấp (cas) tở vong do gây mê, bệnh nhân chết do hít phải nước và rượu u mê nhưng không phải do tác động phụ của chloroform.

- Năm 1940 số liệu khoa báo cáo 15 cas (14 cas xuất hiện trên số liệu phở dùng thuốc mê bởc hỏ trong lúc sanh ngợ âm đởo hay mợ lợy thai và có 5 cas tở vong.).

- Curtis Lester Mendelson báo cáo về “Hít các thành phần dờ dày vào phở i trong gây mê Số n khoa” trên tởp chí Số n phở khoa Mợ 1946.

Hội chứng Mendelson

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 28 Tháng 8 2018 16:31 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 28 Tháng 8 2018 16:48




Đặc trưng của hội chứng này là tình trạng viêm phổi do hít phải dịch dạ dày vào phổi, thường xảy ra trong quá trình hồi sức cấp cứu sau phẫu thuật ổ bụng. Hội chứng này có thể dẫn đến tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Các triệu chứng thường gặp bao gồm ho, sốt, khó thở, đau ngực và thay đổi ý thức. Việc chẩn đoán dựa trên tiền sử phẫu thuật ổ bụng và các triệu chứng lâm sàng. Điều trị tập trung vào việc hỗ trợ hô hấp, điều trị nhiễm trùng và giảm viêm.

Hội chứng Mendelson

Vết bìa Biên tập viên

Thứ ba, 28 Tháng 8 2018 16:31 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 28 Tháng 8 2018 16:48



with a PaO₂ of 200 mm Hg. PaCO₂ tăng có thể có thể tăng hóa. <https://patient.info/doctor/mendelsons-syndrome>