

Bệnh viêm gan siêu vi C

Viết bởi Biên tập viên


Thứ ba, 28 Tháng 8 2018 16:50 -

Khoa Vi Sinh

Viêm gan siêu vi C là bệnh gan do virus viêm gan C gây ra: virus này có thể gây ra cả bệnh viêm gan cấp tính và mãn tính, với mức độ nghiêm trọng từ bệnh nhẹ kéo dài vài tuần đến bệnh nghiêm trọng, suốt đời.

Virus viêm gan C là một loại virus trong máu và các phòng thí nghiệm thực lây nhiễm thông thường nhất là do tiếp xúc với máu. Điều này có thể xảy ra thông qua việc sử dụng thuốc tiêm, thực hành tiêm không an toàn, chăm sóc sức khỏe không an toàn và truyền máu và các sản phẩm máu không được kiểm soát.

Trên toàn cầu, ước tính có 71 triệu người bị nhiễm virus viêm gan C mãn tính. Một số lượng đáng kể những người bị nhiễm mãn tính sẽ phát triển bệnh xơ gan hoặc ung thư gan. Khoảng 399 000 người chết mỗi năm do viêm gan C, phần lớn là do xơ gan và ung thư biểu u mô tế bào gan.



Thuốc kháng vi-rút có thể chữa trị hơn 95% người bị nhiễm virus viêm gan C, do đó làm giảm nguy cơ tử vong do ung thư gan và xơ gan, nhưng việc tiếp cận với chẩn đoán và điều trị thấp.

Hiện tại không có thuốc chữa bệnh viêm gan C; tuy nhiên nghiên cứu trong lĩnh vực này đang được tiến hành.

Bệnh viêm gan siêu vi C

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 28 Tháng 8 2018 16:50 -

Virus viêm gan C (HCV) gây ra cảm nhiễm trùng cấp tính và mãn tính. Nhiễm HCV cấp tính thường không có triệu chứng và chuyển biến khi (nếu có) liên quan đến bệnh đe dọa tính mạng. Khoảng 15-45% số người bị nhiễm bệnh tiếp phát triển bệnh virus trong vòng 6 tháng sau khi bị nhiễm mà không chuyển biến trở lại.

60-80% số người còn lại sẽ bị nhiễm HCV mãn tính. Trong số những người bị nhiễm HCV mãn tính, nguy cơ xơ gan là từ 15-30% trong vòng 20 năm.

Phân bố địa lý

Viêm gan C được tìm thấy trên toàn thế giới. Các khu vực có mức độ nhiễm cao nhất là khu vực Đông Địa Trung Hải và Châu Âu của WHO, với tỷ lệ nhiễm là 2,3% và 1,5%. Tỷ lệ nhiễm HCV ở các khu vực khác của WHO thay đổi từ 0,5% đến 1,0%. Tùy thuộc vào quốc gia, nhiễm vi-rút viêm gan C có thể tập trung ở một số quần thể nhất định (ví dụ, trong số những người tiêm chích ma túy) và / hoặc trong quần thể chung. Có nhiều chủng (họ của kiểu gen) của virus HCV và sự phân bố của chúng thay đổi theo vùng.

Lây truyền

HCV là một loại virus trong máu. Nó thường được truyền qua:

- Tiêm chích ma túy thông qua việc chia sẻ kim tiêm;
- Việc sử dụng dụng cụ hoặc kim tiêm không được khử trùng không đầy đủ, kim tiêm y tế, hoặc kim tiêm là người tiêm và kim tiêm trong các cơ sở y tế; và
- Truyền máu không được kiểm soát và các sản phẩm máu.

Bệnh viêm gan siêu vi C

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 28 Tháng 8 2018 16:50 -

HCV cũng có thể lây truyền qua đường tình dục và có thể truyền từ người mẹ bị nhiễm sang con; tuy nhiên các phương thức lây truyền này ít phổ biến hơn nhiều.


Viêm gan siêu vi C không lây lan qua saliva, thức ăn, nước hoặc bằng cách tiếp xúc bình thường như ôm, hôn và chia sẻ thức ăn hoặc đồ uống với người bị nhiễm bệnh.

Các tính thu được từ mô hình cho thấy rằng trên toàn thế giới, trong năm 2015, đã có 1,75 triệu ca nhiễm HCV mới (trên toàn cầu, 23,7 ca nhiễm HCV mới trên 100.000 dân).

Triệu chứng

Thời gian ủ bệnh viêm gan C là 2 tuần đến 6 tháng. Sau nhiễm trùng ban đầu, khoảng 80% người không biểu hiện bất kỳ triệu chứng nào. Những người có triệu chứng sâu sắc có thể biểu hiện sốt, mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, nôn, đau bụng, nước tiểu sẫm màu, phân màu xám, đau khớp và vàng da (vàng da và lòng trắng mắt).

Sàng lọc và chẩn đoán



Nhà sản xuất và phân phối: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Nam, 100 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM. Mọi thắc mắc xin liên hệ: 0909 123 456.