

Ths Bs Trần Minh Thịnh - Nội tiêu hóa

Đối tượng



Ung thư dài là nguyên nhân thứ hai gây tử vong do bệnh ác tính trên toàn thế giới và thế giới đặc biệt phát hiện ở giai đoạn muộn. Cho đến nay, ung thư dài sớm đang đặc biệt điều tra bao gồm các phòng pháp xâm lấn tối thiểu nhằm điều tra nội soi và phẫu thuật nội soi, trong khi ung thư tiền triệun thì cần xem xét điều tra đa phòng thủ bao gồm hóa trị, xạ trị và phẫu thuật. Vì vậy, phát hiện sớm ung thư dài điều tra phẫu thuật là đặc biệt quan trọng.

Ung thư dài là căn bệnh nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao, riêng năm gần đây, bệnh ung thư dài đặc biệt có xu hướng tăng trưởng. Hiện nay có phòng pháp phòng bệnh tốt, thông tin tuyên truyền tốt hơn so với 15 – 20 năm về trước có những số bệnh nhân ung thư dài vẫn tăng lên là do các yếu tố thay đổi phong, môi trường có nhiều nguy cơ gây ung thư hơn, do người dân không có thói quen đi khám sức khỏe định kỳ. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dự báo, đến năm 2030 sẽ có khoảng 22 triệu ca mắc ung thư màng và 13,2 triệu ca tử vong. Tỷ lệ mắc ung thư dài thay đổi theo địa lý, Việt Nam ung thư dài đứng vị trí thứ 3 ở cả 2 giới.

Có p nhứt chún đoán và điều trung thđ dày giai đoạn sớm

Ví t bì Biên tòp viên

Thứ tò, 19 Tháng 9 2018 15:51 - Lộn còp nhứt cuìi Thđ tò, 19 Tháng 9 2018 16:19



[Xem tiếp tì i đây](#)