

BS HỒ KIẾN PHÁT - Khoa GMHS

PHẦN I

I. Đa số chúng



Ngộ độc thuốc tê (LAST): là một phản ứng bất lợi đe dọa tính mạng có thể xảy ra sau khi dùng thuốc tê thông qua nhiều con đường khác nhau

LAST đã được công nhận trong hơn một trăm năm, nhưng till chính xác chưa rõ. Năm 1928, Hiệp hội y khoa Hoa Kỳ đã báo cáo 40 ca tử vong do LAS. Cocaine chịu trách nhiệm cho một nửa trường hợp, nhưng procain cũng liên quan. Nhận phát hiện này đã thúc đẩy việc tìm kiếm các tác nhân ít độc hại hơn, Lidocain là nhóm gây tê amid đầu tiên sử dụng lâm sàng. Năm 1979, Albright đã nhận mạnh đặc tính tiềm tàng gây tử vong của thuốc tê nhóm amid. Gần đây, các nghiên cứu từ 1993 đến 1997 đã báo cáo tỷ lệ LAST cho gây tê ngoài màng cứng 1,2-11/10000. Tỷ lệ LAST gây tê thần kinh ngoại biên 7,5/10000 năm 1997, 2,5/10000 năm 2004, 9,8//10000 năm 2009, và khi sử dụng siêu âm tỷ lệ này là 8,7/10000 năm 2013

Ngộ độc thuốc tê (Local anesthesia systemic toxicity - LAST)

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 0, 20 Tháng 2 2019 11:33 - Lần cập nhật cuối Thứ 0, 20 Tháng 2 2019 11:47



Nguy cơ thuốc tê (Local anesthesia systemic toxicity - LAST)

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 6, 20 Tháng 2 2019 11:33 - Lần cập nhật cuối Thứ 6, 20 Tháng 2 2019 11:47

Thuốc	Liều tối đa (không pha epinephrin)	Liều tối đa (pha epinephrin)	Thời gian tác dụng	Ghi chú
Lidocain	5 mg/kg	7 mg/kg	30-90 phút	1%= 10mg/ml 2%= 20mg/ml
Bupivacain	2,5 mg/kg	3 mg/kg	6-8 giờ	0,5%= 5mg/ml
Mepivacaine	7 mg/kg	8 mg/kg	-----	-----
Ropivacaine	3 mg/kg	-----	-----	-----

Website: <http://www.duythinh.vn>
Số điện thoại: 090 2553 4900
Địa chỉ: 10/10 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM