


Băng huyết t sau sinh

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 03, 03 Tháng 4 2019 20:32 - Lần cập nhật cuối Thứ 03, 03 Tháng 4 2019 20:44

Bs Thái Phụng Oanh - Khoa Phụ Sản

Băng huyết t sau sinh (BHSS) được xác định là mất máu tích lũy³ 1.000 mL hoặc mất máu do các dấu hiệu hoặc triệu chứng giảm thể tích máu trong vòng 24 giờ sau khi sinh, vốn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong mẹ trên thế giới. Các di chứng thường phát quan trọng khác từ xuất huyết bao gồm hội chứng suy hô hấp cấp, ngừng tim, ngừng thành, sốc, đông máu nội mạch lan tỏa, suy thận cấp, mất khả năng sinh sản và hội chứng Sheehan).



Băng huyết t do n đ n trụy n máu là nguyên nhân hàng đầu gây biến chứng nghiêm trọng cho mẹ

Bảng huyết sau sinh

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 7, 03 Tháng 4 2019 20:32 - Lần cập nhật cuối Thứ 7, 03 Tháng 4 2019 20:44

Hoa Kỳ, theo sau là đồng máu nên mức lan tỏa. Tỷ lệ Hoa Kỳ, tỷ lệ BHSS tăng 26% trong khoảng thời gian từ 1994 đến 2006 chủ yếu là do tăng tỷ lệ đ. TC. Ngược lại, tỷ lệ t. vong m. BHSS đã giảm kể từ cuối những năm 1980 và chỉ m. h. n 10% tỷ lệ t. vong m. (khoảng 1.7 ca t. vong/ 100.000 ca sinh sống) vào năm 2009. Điều này cho thấy giảm tỷ lệ t. vong có liên quan đến việc tăng tỷ lệ truyền máu và c. t TC.

ACOG xác định BHSS là mất máu tích lũy lớn hơn hoặc bằng 1.000 mL hoặc mất máu kèm theo các dấu hiệu hoặc triệu chứng của giảm thể tích máu trong vòng 24 giờ (sau khi sinh) bất kể phương thức sinh nào. Điều này khác với các định nghĩa trước đây về BHSS là mất máu > 500 mL sau khi sinh âm đạo hoặc mất hơn 1.000 mL sau khi sinh mổ. Sự phân loại mới này có khả năng làm giảm số lượng ng. i. đ. c. ch. n đoán BHSS. Tuy nhiên, mất máu ≥ 500 ml khi sinh âm đạo nên đ. c. coi là bất thường và đóng vai trò chủ. đ. nh cho các nhà s. n khoa kiểm soát s. m. t máu gia tăng. Các phương pháp đo lường máu m. t đã c. i. thi. n đ. chính xác c. a. c. tính máu m. t so với t. c. quan. Trong lịch s., giảm 10% hematocrit đã đ. c. đ. xu. t. nh. m. t. đ. u. hi. u. thay th. đ. xác đ. nh BHSS; tuy nhiên, việc xác đ. nh n. ng. đ. hemoglobin hoặc hematocrit th. ng. b. trì hoãn, có th. không ph. n. ánh tình tr. ng. huy. t. h. c. hi. n. t. i. và không h. u. ích v. m. t. lâm sàng trong đ. u. tr. BHSS c. p. tính.

Phương pháp sau sinh, điều quan trọng là phải nhận ra rằng các dấu hiệu nh. p. tim nhanh và h. huy. t. áp th. ng. không xu. t. hi. n. cho đ. n. khi m. t. máu đáng k. . Do đó, m. t. b. nh. nh. n. b. nh. p. tim nhanh và h. huy. t. áp th. ng. m. t. máu chỉ m. 25% t. ng. l. ng. máu c. a. ng. i. ph. n. (hoặc ≥ 1.500 mL tr. lên). Do đó, việc nh. n. bi. t. s. m. v. BHSS tr. c. khi suy giảm các dấu hiệu sinh t. n. nên là m. c. tiêu đ. c. i. thi. n. k. t. qu. .

