

Bs Nguyễn Thị Kiều Trinh - Khoa Phụ Sản

Hoa Kỳ, tỷ lệ sinh mổ gia tăng từ năm 1996 đến năm 2011. Mặc dù, sinh mổ có thể cứu sống thai nhi và mẹ hay cả hai, sự gia tăng tỷ lệ mổ lấy thai (MLT) không làm giảm tỷ suất tử vong cho mẹ và thai. Vì thế, các nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe phải cân nhắc giữa sinh thường và sinh mổ, cũng như các rủi ro an toàn và thích hợp để ngăn ngừa lạm dụng sinh mổ, đặc biệt là MLT lần đầu.




Fig. 1. U.S. delivery rates, 1989–2011. Data from National Vital Statistics. Abbreviations: CD, cesarean delivery; VBAC, vaginal birth after cesarean delivery. *Percent of women who have a vaginal birth after prior cesarean delivery. ¹Rate based on total number of deliveries. (Data from Martin JA, Hamilton BE, Ventura SJ, Osterman MJ, Mathews TJ. Births: final data for 2011. Natl Vital Stat Rep 2013;62(2):1–90.)

Ngăn ngừa an toàn đời sống với mĩ thuật y thai lần đầu

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 18 Tháng 6 2019 06:04 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 18 Tháng 6 2019 06:10

Thủ tục mĩ thuật y thai từ năm 1989 đến 2011

[Xem tiếp tại đây](#)