

**Bs Nguy n Th Hà - Khoa Ung b u**

**I.Ung th bi u mô c a ru t non và ru t th a**

Ung th bi u mô c a ru t non ho c ru t th a là nh ng b nh ung th hi m g p. Ung th bi u mô ru t non t i ch đ c đ i u tr b ng ph u thu t c t b , nh ng tái phát t i ch và xa là ph bi n và đ i u tr ph u thu t t i u là không rõ. Đ i u tr hóa ch t tân b tr đ đ c nghi n c u trong m t th nghi m pha II, 4 trong s 5 b nh nh n có kh i u tá tr ng đ c th ti n hành c t b và tr i qua m t đ p ng b nh lý hoàn toàn.



D li u liên quan đ n đ i u tr ung th bi u mô tuy n ti n tri n c a ru t non ho c ru t th a c ũ ng h u nh b gi i h n hoàn toàn trong các báo cáo h i c u, m c dù g n đây, m t s th nghi m

## Đi u tr ung th đ i tr ng ch a di căn

Vi t b i Biên t p viên

Th b y, 24 Tháng 8 2019 17:09 - L n c p nh t cu i Th b y, 24 Tháng 8 2019 17:18

---

nh , th nghi m pha II v ung th bi u mô ru t non đã đ c báo cáo. M t trong nh ng th nghi m này đã đánh giá capecitabine / oxaliplatin (CAPEOX) đ đi u tr ung th bi u mô tuy n ti n tri n c a ru t non và bóng Vater. T l đáp ng t ng th (ORR) (đi m cu i chính) là 50%, v i 10% đ t đ c đáp ng hoàn ch nh. M t t l đáp ng t ng t (48,5%) đã đ c th y trong m t nghi c u nh phase II khác đã đánh giá hi u qu c a FOLFOX (truy n 5-FU, LV, oxaliplatin) trong đi u tr đ u tiên c a ung th ru t non ti n tri n. T ng t , m t nghi c u pha II khác đã báo cáo t l đáp ng t ng th (ORR) là 45% nh ng b nh nh n m c ung th bi u mô ru t non đ c đi u tr b ng FOLFOX, v i t l s ng không ti n tri n lâu h n (PFS) và t l s ng còn ( OS ) trung bình là 5,9 và 17,3 tháng, t ng ng ng. T l đáp ng v i CAPEOX và FOLFOX cao h n kho ng 18% t l đáp ng đ c th y trong m t nghi c u nh phase II khác đã đánh giá 5-FU / doxorubicin / mitomycin C b nh nh n ung th bi u mô ru t non di căn. M t th nghi m pha II đã báo cáo r ng CAPEOX k t h p v i bevacizumab ho t đ ng và dung n p t t b nh nh n ung th tuy n ru t non.

Các ph ng pháp đi u tr toàn thân khác đ i v i ung th bi u mô ru t non tiên ti n đã đ c đánh giá trong các th nghi m nh pha II bao g m CAPIRINOX và nab-paclitaxel. B nh nh n ung th bi u mô tuy n ru t non đ c đi u tr b ng CAPIRINOX có t l đáp ng là 37,5%, v i t l s ng không ti n tri n lâu h n (PFS) và t l s ng còn ( OS ) trung bình l n l t là 8,9 và 13,4 tháng. K t qu c a m t th nghi m khác cho th y r ng nab-paclitaxel có th là m t l a ch n đ đi u tr ung th bi u mô ru t non c ng đ u.

D li u v đi u tr ung th bi u mô ru t th a c ng khá h n ch . H u h t b nh nh n đ c ph u thu t c t b b ng li u pháp toàn thân ho c trong phúc m c. M t lo t tr ng h p đã ch ra r ng li u pháp h th ng k t h p nh ng b nh nh n m c b nh ti n tri n có th có t l đáp ng t ng t nh đã th y trong ung th đ i tr c tr ng ti n tri n. M t phân tích g n đây c a C s đ li u k t qu NCCN cho th y li u pháp đ a trên fluoropyrimidine là li u pháp h th ng đ c s đ ng ph bi n nh t t i các Vi n thành viên NCCN. Trong s 99 b nh nh n có ph n ng t t nh t đ c ghi nh n, t l đáp ng là 39%, v i t l s ng không ti n tri n lâu h n (PFS) trung bình là 1,2 năm.

## II.Đi u tr ung th đ i tr ng ch a di căn

## Điều trị ung thư đại tràng chia di căn

Viết bởi Biên tập viên

Thứ bảy, 24 Tháng 8 2019 17:09 - Lần cập nhật cuối Thứ bảy, 24 Tháng 8 2019 17:18

---

