

Bs Đặng Thị Quỳnh Chi - Khoa Nội thận - nội tiết

KHUYẾN CÁO	MỨC ĐỘ
Metformin là thuốc được ưu tiên lựa chọn đầu tiên trong điều trị đái tháo đường (ĐTĐ) type 2.	A
Khi đã bắt đầu khởi trị, Metformin nên được chỉ định liên tục miễn là Metformin dung nạp được và không có chống chỉ định. Những thuốc khác bao gồm Insulin nên được thêm vào để phối hợp điều trị cùng với Metformin.	A
Việc sử dụng Metformin trong một thời gian dài có thể gây sự thiếu hụt vitamin B12 và xét nghiệm định lượng vitamin B12 định kỳ nên được xem xét ở những bệnh nhân được chỉ định điều trị với Metformin, đặc biệt ở những bệnh nhân mắc bệnh thiếu máu hoặc bệnh lý thần kinh ngoại biên.	B
Chỉ định điều trị sớm Insulin cần được xem xét nếu có bằng chứng của quá trình dị hóa (sụt cân), nếu có biểu hiện các triệu chứng của Tăng glucose máu hoặc khi HbA1c >10% (>86 mmol/mol) hoặc nồng độ glucose máu tăng cao ≥ 300 mg/dL (16,7 mmol/L) .	E
Xem xét khởi trị với liệu pháp phối hợp 2 thuốc đối với những bệnh nhân mới được chẩn đoán mắc ĐTĐ type 2 có HbA1c cao hơn $\geq 1,5\%$ (12 mmol/mol) so với mục tiêu điều trị.	E

[Xem tiếp tại đây](#)