

CN. Võ Thị Hồng Hạnh – Khoa HHTM

Các kháng thể kháng HLA “tự nhiên” có thể tồn tại ở những người khỏe mạnh, không có tiền sử ghép, truyền máu hay sinh con. Hiện tượng xuất hiện các kháng thể kháng HLA tự nhiên này thường được giải thích là do sự pha trộn chéo với những kháng nguyên thường gặp ở môi trường trong suốt quá trình sống của cá nhân đó. Một số nghiên cứu ước tính tỷ lệ mang kháng thể kháng HLA tự nhiên thấp hơn 1-5%. Tuy nhiên, tỷ lệ này trong một số nghiên cứu lên đến 63% ở nhóm người hiện máu là nam giới khỏe mạnh.

Các kháng thể kháng HLA không do tự nhiên, thường xuất hiện chủ yếu do truyền máu, mang thai hoặc ghép cơ quan. Kháng thể do truyền máu thường là đa giá. Có thể gặp được kháng thể đơn đực hiếm sau lần sinh đầu. Những kháng thể kháng HLA thường thuộc loại IgG và có thể có định bệnh thể hoặc không. Bên cạnh đó có thể gặp kháng thể loại IgM. Kháng thể kháng HLA hay có những pha trộn chéo.

[Xem tiếp tại đây](#)