

Bệnh đa polyp gia đình

Viết bởi Biên tập viên

Thứ sáu, 30 Tháng 4 2021 09:43 - Lần cập nhật cuối Thứ sáu, 30 Tháng 4 2021 09:54

Ths Bs Lê Thị Thu Trang -

Đây là bệnh di truyền, do gen trội trên nhiễm sắc thể thường. Bệnh liên quan trực tiếp nhất là bệnh đa polyp gia đình, liên quan Peutz-Jeghers, liên quan Gardner, và liên quan Turist.

1. Bệnh đa polyp gia đình

Gồm hàng ngàn polyp tân sinh ở niêm mạc dạ dày, đôi khi có cỡ đường kính cao hơn cỡ 1cm, và có蒂. Dù là bệnh di truyền theo gen trội trên nhiễm sắc thể thường, các polyp không xuất hiện trước tuổi 20 đến 30 tuổi. Một người thuộc gia đình mắc bệnh này nếu không có polyp trước tuổi 40 thì cũng không chắc là có polyp trước tuổi.



Các polyp này thường nhỏ, đường kính 1cm, có cuống và là dạng u tuyến. Khi có nhiều, xếp dày đặc, các polyp làm cho bề mặt niêm mạc có dạng nhô lồi. Dưới kính hiển vi, các polyp này thường là u tuyến, ít khi polyp không có cuống, có dạng u tuyến nhánh.

Các polyp này có xu hướng cao trở thành carcinom, nhất là các polyp to và trên các bệnh nhân không được điều trị sớm bằng cách cắt bỏ toàn bộ ruột có polyp. Thời gian có polyp càng dài, khả năng hoá ác càng cao. Khả năng trở thành ung thư của bệnh đa polyp gia đình cao hơn nhiều so với các polyp đã được phẫu thuật. Chẩn đoán polyp bằng nội soi dạ dày, bằng X-quang dạ dày có barít.

Bệnh đa polyp gia đình

Viết bởi Biên tập viên

Thứ sáu, 30 Tháng 4 2021 09:43 - Lần cập nhật cuối Thứ sáu, 30 Tháng 4 2021 09:54



Hình: Bệnh đa polyp ở ruột

Hình: Polyp trong hội chứng Peutz-Jeghers

Phẫu Thuật Nội Khoa, Đại Học Y Khoa Harvard, Boston, Massachusetts, USA. Digestive Surgery, Vol