


Bs. Trần Thị Lý -

GIỚI THIỆU

Hippocrates đã mô tả một hội chứng suy kiệt và mất nhện thực tiễn triền miên như bệnh nhân ốm và sụp đổ. Thuật ngữ từ “kakos” trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là “những điều u ám” và hexus có nghĩa là “trạng thái hiện hữu” thuật ngữ “suy mòn” đã được sử dụng để mô tả việc sụt cân. Từ “an” có nghĩa là “không có” và “orexis” có nghĩa là “thèm ăn, ham muốn”, từ “anoxeria” được sử dụng để mô tả sự chán ăn. Suy mòn là một trạng thái tăng trao đổi chất được xác định là sụt mất nhanh chóng trong bối cảnh bệnh phlegmon viêm mãn tính, được mô tả tốt nhất trong bối cảnh ung thư nhưng cũng được thấy trong các bệnh mãn tính triền miên khác bao gồm AIDS, suy tim, và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD). Mặc dù những thay đổi về thành phần cơ thể không giống nhau trong tất cả các trạng thái bệnh này, nhưng thuật ngữ suy mòn được sử dụng trong tất cả các trường hợp này.

Chán ăn và sụt cân thường gặp ở bệnh nhân mắc một căn bệnh nguy hiểm đe dọa đến tính mạng như ung thư. Tuy nhiên sự sụt cân nghiêm trọng ở bệnh nhân suy mòn do ung thư không phải hoàn toàn là do lượng calo dung nạp kém. Trái ngược với tình trạng đói đói thu nạp, được đặc trưng bởi sự thiếu hụt calo mà có thể được điều chỉnh bằng cách cho ăn thích hợp, tình trạng suy mòn không thể điều chỉnh bằng cách bổ sung calo.

Đánh giá chứng này sẽ bao gồm chẩn đoán, đánh giá và quản lý chứng chán ăn và suy mòn ở bệnh nhân chăm sóc giảm nhẹ. Đánh giá chi tiết hơn về các đặc điểm lâm sàng, các chỉ số sinh và cách quản lý chứng chán ăn và suy mòn liên quan đến ung thư.



Đánh giá và quản lý dinh dưỡng chán ăn và suy mòn trong chăm sóc giảm nhẹ

Viết bởi Biên tập viên

Thứ hai, 06 Tháng 9 2021 16:24 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 06 Tháng 9 2021 16:44

[Xem tiếp tại đây](#)