

Bs Nguyễn Thị Kiều Trinh -

Bệnh nội mạc tử cung là bệnh lý phổ biến khoa phụ sản tính, phức tạp, dễ tái phát, trong đó có sự hiện diện của mô giống mô tuyến nội mạc tử cung và mô đệm tùy hành nằm ngoài buồng tử cung. Sự hiện diện mô nội mạc chày thúc đẩy sự hình thành các phôi nang viêm mãn tính và là bệnh lý phụ thuộc estrogen.

Bệnh nội mạc tử cung bao gồm các thể: nội mạc tử cung đơn thuần, nội mạc tử cung đơn thuần kèm đau, nội mạc tử cung sâu, bệnh tuyến nội mạc tử cung (hay còn gọi là nội mạc tử cung vào cơ tử cung); các thể nội mạc tử cung thường đi kèm với nhau trên cùng một bệnh nhân.


Tỷ lệ suất mắc bệnh không được biết chính xác, ước tính khoảng 10% phụ nữ độ tuổi sinh sản bị nội mạc tử cung. Trong số bệnh nhân nội mạc tử cung có khoảng 40-82% phụ nữ đau vùng chậu mãn tính, 50% phụ nữ nội mạc tử cung bị nhiễm huyết gây hiếm muộn vô sinh, 17-48% là các khối u nội mạc tử cung đơn thuần.

Lâm sàng có thể không có triệu chứng, nhưng nội mạc tử cung thường hay xuất hiện trong bệnh cảnh đau vùng chậu, hiếm muộn, hoặc kết hợp cả hai. Chẩn đoán chủ yếu dựa vào hỏi bệnh sử, khám lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh. Bệnh đòi hỏi một kế hoạch điều trị dài hạn với mục tiêu tiêu diệt và ngăn ngừa tái phát nội khoa tránh lặp đi lặp lại các can thiệp ngoại khoa.

So sánh các triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân trong các nhóm bệnh

Viết bởi Biên tập viên

Chủ nhật, 24 Tháng 10 2021 09:22 - Lần cập nhật cuối Chủ nhật, 24 Tháng 10 2021 09:26



[Mục lục bài viết thêm chi tiết xin đọc thêm tại đây.](#)