


Bs Nguyễn Thị Hải -

Bệnh thủng kinh đái tháo đường (ĐTĐ) là biến chứng mãn tính phổ biến nhất của ĐTĐ, cấp 1 và cấp 2, đống thối nh hống đống nhống ngống i tống đái đống và nhống ngống i tống mống ĐTĐ, với tống mống phống tống tính vống quá 50% ở bệnh nhân mống ĐTĐ. Trong số các đống bệnh lý thủng kinh khác nhau, bệnh thủng kinh ngoại biên do ĐTĐ (diabetic peripheral neuropathy - DPN) là bệnh phổ biến nhất và có số lượng bệnh chứng tin cậy nhất liên quan đến các phống pháp đống u tống.


Có một số khác biệt về mặt dịch tễ học giữa DPN ở bệnh ĐTĐ cấp 1 và cấp 2, mặc dù không có sự khác biệt lớn về cấu trúc trong bệnh lý thủng kinh. Nh đã đống chứng minh bởi DCCT (Thống nghiệm kiểm soát và tuân thủ bệnh ĐTĐ), tống hiống mống bệnh DPN thống nhống ngống i mống ĐTĐ cấp 1 mống đống chứng đoán và số mống (thống gian <10 năm). Tống hiống mống sau đó tăng lên theo thống gian mống bệnh lên đến 34% sau ~ 25 năm, nh đống ghi lống trong nghiên cứu EDIC (Đống thống vống các can thiệp và biến chứng của ĐTĐ). Tống tống ngống đã đống báo cáo tống đó bởi EURODIAB IDDM (Nghiên cứu vống các biến chứng phống thuống vào insulin ở Châu Âu) nhống ngống i đống chứng ngống u nhiên mống ĐTĐ cấp 1 với thống gian tống ngống tống 16 quống gia Châu Âu. Hống nống a, đống liống u tống các nhóm thuống nống p hiống đống i phống ánh các tiêu chuống chăm sóc hiống tống i ở cống hai bống Đống Tây Đống ngống cũng cho kết quống tống ngống tống.

Diabetic Peripheral Neuropathy

Healthy Nerves and Blood Vessels



Nerves and Blood Vessels Damaged by DPN





METABOLICALLY HEALTHY



PREDIABETES AND TYPE 2 DIABETES




SÀNG LẠC VÀ CHẨN ĐOÁN DP



Chẩn đoán và điều trị bệnh thần kinh ngoại biên do đái tháo đường (ADA 2022)

Viết bởi Biên tập viên

Thứ hai, 04 Tháng 4 2022 20:01 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 04 Tháng 4 2022 20:14



Nguồn: *Diagnosis and treatment of painful diabetic peripheral neuropathy, ADA 2022*