

Bs Phan Thị Thành Tâm -

Liên cầu khuẩn nhóm B là gì?

Liên cầu khuẩn nhóm B (Group B streptococcus – GBS) là một trong những loại vi khuẩn thường trú trong cơ thể. Nó thường không gây ra các bệnh lý nghiêm trọng, và không phải là bệnh lây truyền qua đường tình dục (STI). Mặc dù có tên thường gọi, nhưng GBS khác với liên cầu khuẩn nhóm A, là nguyên nhân gây ra bệnh “viêm họng do liên cầu”.



Vì sao GBS là mối quan tâm đối với phụ nữ mang thai?

Trong thai kỳ, GBS thường trú tìm thấy trong âm đạo và trực tràng. Điều đó có nghĩa là GBS có

Sàng lọc và phòng liên cầu khuẩn nhóm B trong thai kỳ

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 31 Tháng 1 2023 18:57 - Lần cập nhật cuối: Thứ tư, 01 Tháng 2 2023 06:06

thì truy cập mã sang thai trong quá trình chuyển dạ. Điều này hiếm khi xảy ra, với tần suất 1-2/100 khi người mẹ không được điều trị kháng sinh trong chuyển dạ. Khả năng mất trẻ sơ sinh mắc bệnh sẽ thấp hơn nhiều khi người mẹ được điều trị.

GBS ảnh hưởng như thế nào lên trẻ sơ sinh?

Mặc dù hiếm khi em bé mắc GBS, nhưng nếu mắc tình trạng sẽ rất nghiêm trọng. Khi trẻ nhiễm GBS sẽ gây nên nhiễm trùng sơ sinh sớm hoặc nhiễm trùng sơ sinh muộn.

Nhiễm trùng sơ sinh sớm là gì?

Nhiễm trùng sơ sinh sớm được định nghĩa là trẻ mắc bệnh nhiễm trùng trong vòng 12-48 giờ hoặc lên đến 7 ngày sau sinh.

- Viêm màng não (meningitis)
- Viêm phổi (pneumonia)
- Nhiễm trùng huyết (sepsis)

Một số loại bệnh trẻ bị nhiễm trùng sơ sinh sớm thường xảy ra khi được điều trị kịp thời.

Nhiễm trùng sơ sinh muộn là gì?

Nhiễm trùng sơ sinh muộn là khi trẻ mắc bệnh nhiễm trùng từ một tuần đến vài tháng sau sinh. Trẻ thường mắc bệnh do tiếp xúc với mẹ sau khi sinh nếu mẹ mắc bệnh. Nhưng trẻ cũng có thể mắc bệnh khi tiếp xúc với môi trường khác mẹ GBS.

Nhiễm trùng sơ sinh muộn cũng rất nguy hiểm và gây nên viêm màng não. Trẻ sơ sinh, đặc biệt là trẻ có triệu chứng của viêm màng não có thể khó phát hiện ra. Liên hệ với bác sĩ ngay nếu con bạn có các dấu hiệu sau:

Sàng lọc và đề phòng liên cầu khuẩn nhóm B trong thai kỳ

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 31 Tháng 1 2023 18:57 - Lần cập nhật cuối Thứ tư, 01 Tháng 2 2023 06:06

- Lộ rỉ
- Quấy khóc
- Bú kém
- Sốt cao

Tôi có được xét nghiệm liên cầu nhóm B hay không?

Có, thai phụ được sàng lọc GBS như là một phần của chăm sóc tiền sản thông thường. Nuôi cấy để phát hiện GBS, được thực hiện từ tuần 36-38 của thai kỳ. Bệnh phẩm được lấy từ âm đạo và trực tràng bằng một que tăm bông.

Nếu kết quả dương tính thì sẽ như thế nào?

Nếu kết quả cho thấy có GBS, hầu hết thai phụ sẽ được điều trị kháng sinh đường tĩnh mạch khi bắt đầu chuyển dạ. Điều này giúp bảo vệ thai nhi không bị nhiễm bệnh. Thời điểm tốt nhất để điều trị là trong chuyển dạ. Penicillin là kháng sinh thông thường được sử dụng để ngăn ngừa nhiễm trùng sơ sinh sơ mẫn, nhưng không ngăn ngừa được nhiễm trùng sơ sinh muộn.

Nếu tôi bị dị ứng với penicillin?

Nếu bạn bị dị ứng với penicillin, thông báo với bác sĩ trước khi bạn được xét nghiệm GBS. Bạn có thể được test dị ứng da để phát hiện mức độ nghiêm trọng của tình trạng dị ứng. Một loại kháng sinh khác sẽ được sử dụng khi cần thiết.

Có thể sử dụng kháng sinh mà không cần xét nghiệm trước đó hay không?

Trong một số trường hợp, thai phụ sẽ được kháng sinh thông thường quy trong chuyển dạ mà không cần xét nghiệm GBS. Kháng sinh có thể được sử dụng mà không cần xét nghiệm khi:

Sàng lọc và phòng ngừa liên quan đến nhóm B trong thai kỳ

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 31 Tháng 1 2023 18:57 - Lần cập nhật cuối: Thứ tư, 01 Tháng 2 2023 06:06

- Bạn có đưa ra con trỏ về nhiễm GBS
- Bạn có GBS trong tuần cung cấp bất kỳ thời điểm nào trong suốt thai kỳ
- Tình trạng nhiễm GBS không được biết khi bạn vào chuyển dạ và có sốt
- Tình trạng nhiễm GBS không được biết khi bạn vào chuyển dạ trước 37 tuần
- Tình trạng nhiễm GBS không được biết và chỉ có trên 18 giờ
- Tình trạng nhiễm GBS không được biết trong thai kỳ. Nếu bạn này không có xét nghiệm GBS định kỳ tính từ thai kỳ trước.

Nếu như tôi đã sinh con?

Những thai phụ mà lấy thai không cần sử dụng kháng sinh cho tình trạng nhiễm GBS trong khi sinh nếu không có chuyển dạ và chỉ không vậy. Những phụ nữ thai phụ này vẫn nên xét nghiệm GBS bởi vì chuyển dạ có thể xảy ra trước khi mà lấy thai. Nếu kết quả xét nghiệm định kỳ tính, em bé có thể cần phải theo dõi nhiễm GBS sau sinh.

Tham khảo: <https://www.acog.org/womens-health/faqs/group-b-strep-and-pregnancy>