

Bs Lê Bào Ngọc -

Kể từ những hợp tác nghiên cứu đầu tiên của Vilmann và cộng sự tiến hành chọc hút bằng kim nhíp siêu âm nội soi đầu tiên được công bố năm 1992, với nhu cầu tiến bộ đáng kể của nội soi (đầu dò, kim chọc hút), cùng với sự tiến bộ vượt bậc của y học trong lĩnh vực ung thư học và di truyền y học phân tử, vai trò lâm sàng của EUS-FNA ngày càng trở nên quan trọng và hấp dẫn hơn, không chỉ đáng lưu ý cho chẩn đoán xác định khối u và giai đoạn của nó, mà còn tiến xa hơn trong điều trị và tiên lượng bệnh, mở ra những ghi nhận mới hơn trong nội soi tiêu hóa.

Các chỉ định quan trọng nhất của EUS-FNA là lấy sinh thiết từ các lympho node N1 / M1 trong bệnh lý ác tính thực quản, hạch bạch huyết trung thất (nghi ngờ khối u phổi N2 / 3) và khối u tụy, đánh giá ung thư, các hạch / khối u quanh trạc tràng và sau phúc mạc, thủng thực quản trái, thủng trái của gan và các ổ viêm.



[Xem tiếp tại đây](#)