


Bs. Nguyễn Quốc Việt -

I. TỔNG QUAN

Xạ trị vùng chậu là một công cụ quan trọng trong kho vũ khí trị liệu để điều trị ung thư vùng chậu, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư cổ tử cung, ung thư trực tràng hoặc ung thư bàng quang. Nhờ các tiến bộ trong kỹ thuật xạ trị, chẳng hạn như xạ trị điều biến cường độ (IMRT), xạ trị lập thể và xạ trị áp sát dựa trên hình ảnh, đã giúp cung cấp liều ngày càng hiệu quả với liều độc hại thấp hơn cho các mô lành. Tuy nhiên, bàng quang là cơ quan quan trọng có thể chịu ảnh hưởng từ liều xạ trị phóng xạ thấp. Mặc dù các kỹ thuật đã được cải thiện, chiếu xạ vùng chậu vẫn là nguyên nhân gây ra các tác động phụ cấp tính hoặc muộn như viêm bàng quang do chiếu xạ. Do đó, thuật ngữ “viêm bàng quang do chiếu xạ” bao gồm tất cả các tổn thương và triệu chứng của bàng quang sau khi chiếu xạ các cơ quan vùng chậu. Mặc dù nghiêm trọng của nó liên quan đến liều xạ trị tiếp xúc với bàng quang, tổn thương từ các cấp cũng như lịch trình và phân độ tổn thương khác nhau. Bệnh chuyển từ nhẹ có thể hồi phục đến nặng hơn có thể dẫn đến biến chứng lâu dài có thể đe dọa tính mạng ngày càng tăng và sự hiểu biết về các tiến bộ và cách xử lý viêm bàng quang do chiếu xạ là điều cần thiết.



Viêm bàng quang xu t huy t sau x tr vùng ch u

Vi t b i Biên t p viên
Th năm, 18 Tháng 1 2024 15:55 -

[Xem ti p t i đây](#)