Vi□t b□i Biên t□p viên
Th□ t□, 17 Tháng 7 2013 12:41 - L□n c□p nh□t cu□i Th□ t□, 17 Tháng 7 2013 12:58

Ths Lê T□ Đ□nh - Khoa ICU

Theo m□t nghiên c□u g□n đây, vi□c s□ d□ng warfarin, m□t thu□c ch□ng đông máu đ□ ngăn ng□a đ□t qu□ □ nh□ng b□nh nhân nh□p vi□n v□i ch□ng rung nhĩ v□n còn d□□i m□c t□i □u.

"Chúng tôi phát hi□n 73 trong s□ 119 b□nh nhân có nguy c□ cao b□ đ□t qu□ không đào th□i warfarin", tr□□ng nhóm nghiên c□u, BS Lim Toon Wei, giám đ□c đ□n v□ chăm sóc m□ch vành, Trung tâm Tim m□ch Đ□i h□c Qu□c gia Singapore cho bi□t. "Ch□y máu là lý do s□ 1 đ□ th□y thu□c không dùng thu□c ch□ng đông cho b□nh nhân."

Các nghiên c□u h□i c□u bao g□m 1.826 b□nh nhân nh□p vi□n t□i đ□n v□ tim m□ch c□a B□nh vi□n Đ□i h□c Qu□c gia t□ tháng 1 đ□n tháng 3.2010. Trong s□ nh□ng b□nh nhân này, có 163 b□nh nhân rung nhĩ không có b□nh lý van tim và 119 b□nh nhân là có nguy c□ cao b□ đ□t qu□. G□n 60 % là nam gi□i. Tu□i trung bình là 69 tu□i.

Nh□ng b□nh nhân l□n tu□i và nh□ng ng□□i có ti□n s□ ch□y máu hi□m khi d□□c dùng warfarin. Trong s□ nh□ng b□nh nhân đang dùng warfarin, 40,7 % không n□m trong gi□i h□n đi□u tr□ ch□ng đông, khi□n h□ tăng nguy c□ huy□t kh□i. G□n 19% n□m trong gi□i h□n đi□u tr□ ch□ng đông, cho th□y tăng nguy c□ ch□y máu.

Vi□t b□i Biên t□p viên
Th□ t□, 17 Tháng 7 2013 12:41 - L□n c□p nh□t cu□i Th□ t□, 17 Tháng 7 2013 12:58

[redacted]