

Chăm sóc bệnh nhân gãy liên mấu chuyên xương đùi

Vị trí bài Biên tập viên

Thứ bảy, 18 Tháng 10 2014 16:29 - Lần cập nhật cuối Thứ bảy, 18 Tháng 10 2014 16:41

ĐD Phạm Thị Huỳnh Công - Ngoại CT

A. ĐIỀU TRỊ BỆNH KHÔNG PHỤ THUẬT:

Bệnh nhân gãy liên mấu chuyên xương đùi loại không di lệch hoặc di lệch vừa thường được điều trị bảo tồn:

- Bệnh nhân trẻ có thể được bó bột chèn đùi bàn chân và cho tập sớm.
- Bệnh nhân lớn tuổi, đa số được bó bột chèn xoay
- Gãy liên mấu chuyên điều trị bảo tồn thường lành xương sau 3 -5 tháng nhưng bệnh nhân chèn có thể xảy ra bệnh nhân lớn tuổi do nằm lâu.

Chăm sóc bệnh nhân gãy liên mấu chuyên xương đùi

Vị trí bài Biên tập viên

Thứ bảy, 18 Tháng 10 2014 16:29 - Lần cập nhật cuối Thứ bảy, 18 Tháng 10 2014 16:41



Chẩn đoán lâm sàng: Gãy liên mấu chuyên xương đùi bên phải.
Chẩn đoán hình ảnh: X-quang khớp háng và đầu gối, thấy rõ gãy liên mấu chuyên xương đùi bên phải.
Chẩn đoán cận lâm sàng: Xét nghiệm máu, nước tiểu, và các xét nghiệm khác theo chỉ định của bác sĩ.
Chẩn đoán bệnh nhân: Bệnh nhân có gãy liên mấu chuyên xương đùi bên phải, cần được chăm sóc y tế kịp thời.